

فهرست قارچ کش های تصویب شده تا شهریور ماه ۱۴۰۵

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	بیماری	محصول	کارنس	دز مصرف	تاریخ ثبت
۱	آزوکسی استروبین ۲۰۰ گرم/لیتر+ دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/لیتر	ارتیواتاپ	۳۲/۵٪	SC	سینجنتا	سفیدک پودری	جالیز- مزرعه.گلخانه	خیار: ۲ روز	مزرعه: ۱ لیتر در هکتار	۸۸/۹/۳۰
								گوجه فرنگی: ۲ روز	گلخانه: ۰/۷۵ در هزار	
۲	آزوکسی استروبین ۲۰۰ گرم/لیتر+ دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/لیتر	ارتیواتاپ	۳۲/۵٪	SC	سینجنتا	لکه برگ سرکوسپورایی	چغندر قند	-	۱ لیتر در هکتار	۹۹/۱۰/۲۲
۳	آزوکسی استروبین ۲۰۰ گرم/لیتر+ دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/لیتر	ارتیواتاپ	۳۲/۵٪	SC	سینجنتا	لکه موجی	گوجه فرنگی	۳ روز	۱۳۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۴	آزوکسی استروبین ۲۰۰ گرم/لیتر+ دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/لیتر	سفیر	۳۲/۵٪	SC	بارزگانان سرای سپند	سفیدک پودری	خیار گلخانه	۲ روز	۰/۷۵ در هزار حداکثر دو بار سمپاشی	۹۷/۷/۱۶
۵	آزوکسی استروبین ۲۰۰ گرم/لیتر+ دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/لیتر	دیفوروبین	۳۲/۵٪	SC	کاوش کیمبای کرمان	سفیدک پودری	خیار گلخانه	۲ روز	۰/۷۵ در هزار حداکثر دو بار سمپاشی	۹۷/۷/۱۶
۶	آزوکسی استروبین ۱۲۵g/l+دیفنو کونازول ۱۲۵ g/l	بیکانتا	۲۵٪	SC	سینجنتا	سپتوریای برگ	گندم	-	یک لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۱۱/۳
۷	آزوکسی استروبین ۲۰۰ گرم/لیتر + سیپروکونازول ۸۰ گرم/لیتر	آمیستاراکسترا	۲۸٪	SC	سینجنتا	زنگ زرد	گندم	۳۵ روز	۰/۷۵ لیتر در هکتار	۹۲/۸/۲۷
۸	آزوکسی استروبین ۲۰٪+سیازوفامید ۱۰٪	سیازوبین	۳۰٪	SC	پاک سم ایرانیان Tianjin Highpoint Plant Protection	سفیدک داخلی	خیار	۳ روز	۱/۲ میلی لیتر در هزار	۱۴۰۳/۹/۵
۹	اپوکسی کونازول	اپوس (opus)	۱۲/۵٪	SC	BASF	سفیدک پودری	چغندر قند	۲۸ روز	۱ لیتر در هکتار	۸۲/۲/۱

۹۲/۳/۲۷	۰/۵ لیتر در هکتار	۴۲ روز	گندم	بیماری فوزاریمی سنبله	ب آ اس اف	SC	۴۹/۷٪	رکس دو	اپوکسی کونازول ۱۸۷ گرم /لیتر+تیوفانات متیل ۳۱۰ گرم/لیتر	۱۰
۹۷/۶/۲۷	۰/۵ لیتر در هکتار	۴۲ روز	گندم	زنگ زرد	ب آ اس اف	SC	۴۹/۷٪	رکس دو	اپوکسی کونازول ۱۸۷ گرم /لیتر+تیوفانات متیل ۳۱۰ گرم/لیتر	۱۱
۹۷/۷/۱۶	۰/۵ لیتر در هکتار	۴۳ روز	چغندر قند	سفیدک پودری	ب آ اس اف	SC	۴۹/۷٪	رکس دو	اپوکسی کونازول ۱۸۷ گرم /لیتر+تیوفانات متیل ۳۱۰ گرم/لیتر	۱۲
۹۸/۱۰/۹	۴ در هزار	ندارد	توت فرنگی	کپک خاکستری	روماک گستر غرب	EC	۶۰٪	روماک	اسانس روغن بنه	۱۳
۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۰/۵ لیتر در هکتار جوانه زنی شاخه ها و با فاصله ۱۴ روز از سمپاشی	۱۴ روز	انگور	سفیدک پودری	بایر آگ	CS	۳۰٪	پروسپر	اسپیروکسامین	۱۴
۱۴۰۳/۵/۱	دو در هزار	-	گندم	سیاهک پنهان (ضد عفونی بذور)	پاک گستر پرند	SL		فورمایسین گلد پی ایکس	اسید پراستیک ۲۰٪+پراکسید هیدروژن	۱۵
۱۴۰۳/۶/۲۶	۴ در هزار	-	لیموترش	جاروک	جاوید شیمی فارس	L	۰.۱۳	آزینو	اسیدهای آمینه	۱۶
۹۹/۱۱/۶	۲ در هزار	۲۱ روز	گردو	آنتراکنوز	رها اندیش کاوان Nordox	WG	۴۵٪	ردشیلد	اکسید مس	۱۷
۱۴۰۱/۵/۱۰	۲ در هزار	۱۵ روز	درختان میوه هسته دار	شانکر باکتریایی <i>Pseudomonas syringae</i>	رها اندیش کاوان Nordox	WG	۴۵٪	رد شیلد	اکسید مس	۱۸
۹۱/۶/۳۰	۱ در هزار	۱۵ روز	درختان میوه دانه دار	آتشک	نوردوکس آ.اس نروژ	WG	۷۵٪	نوردوکس	اکسید مس	۱۹
۹۰/۴/۱۳	۲/۵ در هزار	۱۵ روز	هلو	پیچیدگی برگ	نوردوکس آ.اس نروژ	WG	۷۵٪	نوردوکس	اکسید مس	۲۰

۲۱	اکسید مس	نوردوکس	۷۵٪	WG	نوردوکس آ.اس نروژ	سفیدک داخلی	سیب زمینی	۱۵ روز	۱ کیلوگرم در هکتار	۹۴/۷/۶
۲۲	اکسید مس	نوردوکس	۷۵٪	WG	نوردوکس آ.اس نروژ	پوسیدگی طوقه و ریشه	برنج	-	۱۳۰ گرم برای یکصد کیلوگرم بذر	۹۶/۴/۱۹
۲۳	اکسید مس (نوردوکس) ۲۵/۸٪+متالاکسیل ۶٪	نوردوکسیل	۳۱/۸٪	SC	Zhejiang Heben Pesticides and chemical	سفیدک داخلی	توتون	-	۱/۵ لیتر در هکتار (خزانة)	۱۴۰۰/۹/۲۹
									۲ لیتر در هکتار (مزرعه)	
۲۴	اکسی کلرور مس (دارای ۲۹/۷۵٪ یون مس)	کوپر پلاس	۵۰٪	WP	آرمان سبز آدینه شیام کمیکالز	سفیدک داخلی	گوجه فرنگی	۳ روز	۲ در هزار	۱۴۰۰/۴/۱۴
۲۵	اکسی کلرور مس (دارای ۲۹/۷۵٪ یون مس)	فلیت	۵۰٪	WP	بصیر شیمی پارس ایزاگرو ایتالیا	گموز فایتوفترایی طوقه پوسیدگی ریشه	مرکبات	-	۱۰۰ گرم در لیتر	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۲۶	اکسی کلرور مس (دارای ۳۵٪ یون مس)	اکسی کلرور پرتونار	۵۸/۸٪	SC	پرتونار ویمال هند	سفیدک داخلی	خیار	۳ روز	۳/۵ در هزار	۱۴۰۰/۶/۱
۲۷	اکسی کلرور مس (دارای ۵۸/۳٪ یون مس)	کوپراکسی کلرید برزگر	۸۵٪	WP	برزگر برجسته Agro life Science corporation	پیچیدگی برگ	هلو	-	۴ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱۵
۲۸	اکسی کلرور مس (دارای ۳۵٪ یون مس)	کوپراویت	۵۸/۸٪	WP	بایر کروپ ساینس	مومیایی پیچیدگی برگ	درختان میوه سردسیری	۱۴ روز	۳ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب	۴۷/۱۰/۱
۲۹	اکسی کلرور مس (دارای ۳۵٪ یون مس)	کوپراویت	۵۸/۸٪	WP	بایر کروپ ساینس	پیچیدگی برگ	هلو	۱۴ روز	۳ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب	۴۷/۱۰/۱

۳۰	اکسی کلرور مس (دارای ۳۵٪ یون مس)	کوپراویت	۵۸/۸٪	WP	بایر کروب ساینس	پوسیدگی گل اذین	نخیلات	-	۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب	۴۷/۱۰/۱
۳۱	اکسی کلرور مس (دارای ۳۵٪ یون مس)	کوپراویت	۵۸/۸٪	WP	بایر کروب ساینس	سفیدک داخلی	گوجه فرنگی	۳ روز	۳ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۲	اکسی کلرور مس (دارای ۳۵٪ یون مس)	کوپراویت	۵۸/۸٪	WP	بایر کروب ساینس	سفیدک داخلی	سیب زمینی	-	۳ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۳	اکسی کلرور مس (دارای ۳۵٪ یون مس)	کوپراویت	۵۸/۸٪	WP	بایر کروب ساینس	سفیدک داخلی	سبزی و جالیز	۳ روز	۱-۲ کیلوگرم در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۳۴	اکسی کلرور مس (دارای ۳۵٪ یون مس)	کوپراویت	۵۸/۸٪	WP	بایر کروب ساینس	گموز	مرکبات	-	دوغاب ۱٪	۴۷/۱۰/۱
۳۵	اکسی کلرور مس (دارای ۳۵٪ یون مس)	کیمیا کوپر اکسی	۵۸/۸٪	SC	کاوش کیمیای کرمان	سفیدک داخلی	خیار	۳ روز	۳/۵ در هزار	۱۴۰۰/۶/۱
۳۶	اکسی کلرور مس ۳۹/۷۵٪ + سیموکسانیل ۴/۲٪	کوپروسیت سی	۴۳/۹۵٪	WP	دلتا پارس نهاده اگر یا	سفیدک داخلی	خیار	۵ روز	۳ کیلو گرم در هکتار	۹۴/۶/۲۳
۳۷	اکسی کلرور مس ۱۴/۱۹٪ + مفتوکسام (متالاکسیل ام) ۲٪	ریدومیل گلد آر	۱۶/۱۹٪	WG	سینجنتا	سفیدک داخلی	خیار	۳ روز	گلخانه: ۶ در هزار فضایی باز: ۶ کیلوگرم در هکتار (دوبار سمپاشی در فصل زراعی به فاصله ۱۴ روز)	۱۴۰۰/۹/۲۹
۳۸	اکسی کلرور مس ۱۴٪ + هیدروکسید مس ۱۴٪	BADGE	۲۸٪	WG	بازارگان کالا ISAGRO	پیچیدگی برگ	هلو	۷ روز	۱/۲ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱۵
۳۹	اکسی کلرور مس ۱۴٪ + هیدروکسید مس ۱۴٪	BADGE	۲۸٪	WG	بازارگان کالا ISAGRO	سفیدک داخلی	گوجه فرنگی	سه روز	۲/۵ کیلوگرم در هکتار	۱۴۰۱/۵/۱۰

۴۰	امتوکنترادین ۳۰٪+ دیمتومورف ۲۲/۵٪	اوروگو	۵۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک داخلی	خیار (فضای باز و گلخانه)	۱ روز	۰/۷ در هزار استفاده بیش از دو نوبت متوالی و بیش از چهار نوبت در یک دوره تولید ممنوع است.	۹۷/۱۰/۱۷
۴۱	امتوکنترادین ۳۰٪+ دیمتومورف ۲۲/۵٪	اوروگو	۵۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک داخلی	هندوانه	۱ روز	۰/۷ در هزار در فواصل زمانی ۷-۱۰ روز جهت کنترل بیماری	۹۹/۲/۸
۴۲	امتوکنترادین ۳۰٪+ دیمتومورف ۲۲/۵٪	اوروگو	۵۳/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک داخلی	انگور	۱ روز	۱ در هزار، در فواصل زمانی ۷-۱۰ روز جهت کنترل بیماری	۹۹/۴/۳۰
۴۳	ایپرودیون	رورال	۵۰٪	WP	بایر آگ	ساکریپرو کتونیایی ساقه و	سیب زمینی	-	۲٪ وزن غده	۸۶/۱۰/۱۰
۴۴	ایپرودیون ۳۵٪ + کاربندازیم ۱۷/۵٪	رورال تی اس	۵۲/۵٪	WP	بایر آگ	شیت بلاست	برنج	-	۱ کیلوگرم در هکتار	۶۴/۷/۲۲
۴۵	ایپرودیون ۳۵٪ + کاربندازیم ۱۷/۵٪	رورال تی اس	۵۲/۵٪	WP	بایر آگ	لکه قهوه ای نواری	جو	-	۱ در هزار به روش ضد عفونی بذر	۷۵/۱۲/۶
۴۶	ایپرودیون ۳۵٪ + کاربندازیم ۱۷/۵٪	رورال تی اس	۵۲/۵٪	WP	بایر آگ	خشکیدگی سر شاخه	توت	-	۱ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب	۶۴/۷/۲۲
۴۷	ایپرودیون ۳۵٪ + کاربندازیم ۱۷/۵٪	رورال تی اس	۵۲/۵٪	WP	بایر آگ	حفظ و نگهداری (انبارداری)	مرکبات	-	۱ در هزار	۸۰/۳/۲۱
۴۸	ایزوپروتیولان	فوجی وان	۴۰٪	EC	نیهون نوهیاکو	بلاست	برنج	۱۴ روز	۱/۲۵ لیتر در هکتار	۹۶/۳/۱
۴۹	ایمازالیل	فونگافلور	۵٪	LS	داو اگرو ساینس	لکه قهوه ای نواری	جو	-	۱ در هزار (به روش ضد عفونی بذر)	۷۵/۱۲/۶
۵۰	ایمازالیل ۲/۰٪+تیابندازول ۵/۰٪	سیترازول آ	۰/۷٪	وکس آماده	Productos Citrosol S.A	حفظ و نگهداری (انبارداری)	مرکبات	-	واکس آماده مصرف (اندود کردن میوه با اسفنج)	۸۰/۳/۲۱

۵۱	ایمینو کتادین تریس	بلکیوت	۴۰٪	WP	نیپون سودا	سفیدک پودری	خیار	۱ روز	۰/۷۵-۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۹۲/۴/۱۷
۵۲	ایمینو کتادین تریس	بلکیوت	۴۰٪	WP	نیپون سودا	لکه موجی (آلترناریا)	سیب زمینی	۷ روز	۷۵۰ گرم در هکتار	۹۳/۳/۱۲
۵۳	ایمینو کتادین تریس	بلکیوت	۴۰٪	WP	نیپون سودا	سفیدک پودری	انگور	۷ روز	۰/۷۵ در هزار	۹۵/۸/۲۴
۵۴	باسیلوس سوبتیلیس <i>Bacillus subtilis</i>	کانگ می	۵٪	WP	گیاه پرنیان اطلس Deqiang Biology	بلاست	برنج	۲ روز	۱۸۰ گرم در هکتار به محض مشاهده علائم بیماری یک بار محلول پاشی	۹۷/۲/۲۴
۵۵	باسیلوس سوبتیلیس <i>Bacillus subtilis</i>	کانگ می	۵٪	WP	گیاه پرنیان اطلس Deqiang Biology	لکه موجی (آلترناریا)	گوجه فرنگی	-	۱/۲۵ در هزار در مراحل اولیه رشد گیاه و مراحل اولیه بیماری	۱۴۰۱/۴/۲۰
۵۶	باسیلوس سوبتیلیس <i>Bacillus subtilis</i>	سرناد	۱۰ ^{۱۲}	SC	بایرآلمان	کپک خاکستری	توت فرنگی گلخانه	ندارد	۵ در هزار	۹۸/۱۰/۹
۵۷	باسیلوس سوبتیلیس <i>Bacillus subtilis</i>	سرناد	۱۰ ^{۱۲}	SC	بایرآلمان	پژمردگی فوزاریومی	گوجه فرنگی گلخانه	ندارد	۱۰ لیتر در هکتار به روش خیساندن خاک پس از انتقال نشاء	۱۴۰۰/۹/۲۲
۵۸	باسیلوس سوبتیلیس <i>Bacillus subtilis</i>	رویین ۱	۱۰ ^۷	پودر مرطوب	زیست فناوری سبز	پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه	چغندر قند	ندارد	۲۰۰ گرم در هکتار، ۴۵ و ۹۰ روز پس از کاشت	۹۹/۴/۳۰
۵۹	باسیلوس ولزنسیس	پارس باسیل	۱۰ ^۸	SC	رویان تيسان	پژمردگی فوزاریوی	گوجه فرنگی گلخانه	ندارد	در سه مرحله به ترتیب با دزهای ۵، ۵ و ۴ لیتر در هکتار	۹۸/۸/۲۷

۶۰	باسیلوس ولزنسیس	پارس باسیل	۱۰ ^۸	SC	رویان تيسان	بلاست برگ	برنج	۴ در هزار بعد بعد از ظهور اولین لکه های بیماری در مرحله رویشی گیاه برای کنترل بلاست یقه و برگ برنج در صورت خفیف بودن بیماری در مدیریت تلفیقی	۱۴۰۴/۳/۵
۶۱	باسیلوس ولزنسیس	پارس باسیل	۱۰ ^۸	SC	رویان تيسان	پاخوره	گندم	۱/۶ لیتر به ازای ۲۰۰ کیلوگرم بذر برای ضد عفونی بذور	۱۴۰۵/۱/۳۱
۶۲	بردو (مخلوط بردو) (۴/۵۸٪ یون مس)	میشو بردوکس	۱۸٪	SC	سبزآور پردیس	بیماری غربالی	زردآلو	۱۰ در هزار دو مرحله	۹۳/۱۲/۴
۶۳	بردو (مخلوط بردو) (۴/۵۸٪ یون مس)	بردو کیمیا	۱۸٪	SC	کاوش کیمیا کرمان	شانکر سیتوسپرای	سیب	۲ درصد محلول پاشی توأم با پانسمان شانکر با بردو کیمیا ۸ درصد	۹۴/۱۰/۷
۶۴	بردو (مخلوط بردو) (۴/۵۸٪ یون مس)	بردو بهسم	۱۸٪	SC	البرز بهسم	بیماری غربالی	زردآلو	۱۰ در هزار	۹۶/۱۱/۱۶
۶۵	بردو (مخلوط بردو) (۴/۵۸٪ یون مس)	بردوسیف	۱۸٪	SC	سبزآور نگین فلات	آتشک	درختان میوه دانه دار	۸ در هزار در مرحله جوانه و ۵ در هزار در مرحله ۵ درصد، ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد گل	۹۶/۲/۲۵
۶۶	بردو (مخلوط بردو) (۴/۵۸٪ یون مس)	بردوسیف	۱۸٪	SC	سبزآور نگین فلات	سفیدک داخلی	خیار(گلخانه)	۵ در هزار	۹۷/۹/۲۶
۶۷	بردو (مخلوط بردو) (۴/۵۸٪ یون مس)	بردوسیف	۱۸٪	SC	سبزآور نگین فلات	پپیدگی برگ	هلو	۸ در هزار	۹۸/۳/۲۷
۶۸	بردو (مخلوط بردو) (۵٪ یون مس)	بردو سمیران	۲۰٪	SC	سمیران	پپیدگی برگ	هلو	۵-۸ در هزار در زمان ریزش برگ در پاییز و تورم جوانه در بهار	۹۶/۳/۱
۶۹	بردو (مخلوط بردو) (۵٪ یون مس)	بردوکسین	۲۰٪	SC	اکسین شیمی آدان	سفیدک داخلی	خیار(گلخانه)	۵ در هزار	۹۷/۹/۲۶
۷۰	بردو (مخلوط بردو) (۵٪ یون مس)	بردوتکس	۲۰٪	SC	پرتونار	سفیدک داخلی	خیار(گلخانه)	۵ در هزار	۹۷/۹/۲۶

۷۱	بردو (مخلوط بردو) (۵٪ یون مس)	بردوتکس	۲۰٪	SC	پرتونار	پیچیدگی برگ	هلو	۷ روز	۹ در هزار	۹۸/۳/۲۷
۷۲	بردو (مخلوط بردو) (۴/۵۸٪ یون مس)	بردوفیکس	۱۸٪	SC	باغبان تاک	سفیدک داخلی	گوجه فرنگی	۷ روز	۵ در هزار	۹۷/۳/۲۸
۷۳	بردو (مخلوط بردو) (۴/۵۸٪ یون مس)	بردوفیکس	۱۸٪	SC	باغبان تاک	آتشک درختان میوه	دانه دار	۷ روز	۱۰ در هزار در مرحله جوانه و ۴ در هزار در مرحله ۵، ۵۰ و ۱۰۰ درصد گل	۹۷/۸/۱۴
۷۴	بردو (مخلوط بردو) (۴/۵۸٪ یون مس)	بردوفیکس	۱۸٪	SC	باغبان تاک	پیچیدگی برگ	هلو	۷ روز	۱۰ در هزار	۹۸/۳/۲۷
۷۵	بردو (مخلوط بردو) (۴/۵۸٪ یون مس)	بردوفیکس	۱۸٪	SC	باغبان تاک	سفیدک داخلی	خیار(گلخانه)	۷ روز	۵ در هزار	۹۷/۹/۲۶
۷۶	بردو (مخلوط بردو) (۴/۵۸٪ یون مس)	بردو فیکس	۱۸٪	SC	باغبان تاک	بیماری غربالی	زرد الو	۷ روز	۱۵-۱۰ در هزار	۸۴/۶/۱۴
۷۷	بردو (مخلوط بردو) (۵٪ یون مس)	بردو جی	۲۰٪	SC	گیاه	بیماری غربالی	زردالو	۷ روز	۹ در هزار	۹۷/۱۲/۱۳
۷۸	بردو (مخلوط بردو: پیک دوتایی سولفات مس + هیدروکسید کلسیم)	-	-	سولفات مس + هیدروکسید کلسیم میکرونیزه	-	پوسیدگی طوقه (گموز)	مرکبات	-	۱۰-۵ درصد	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۷۹	بردو (مخلوط بردو: پیک دوتایی سولفات مس + هیدروکسید کلسیم)	-	-	سولفات مس + هیدروکسید کلسیم میکرونیزه	-	شانکر	درختان میوه سرد سیری	۷ روز	۱ کیلو گرم سولفات مس ۵ آبه + ۱/۲۵ کیلو گرم هیدروکسید کلسیم در ۱۰۰ لیتر آب برای سمپاشی با HV	۴۷/۱۰/۱
۸۰	بردو (مخلوط بردو: پیک دوتایی سولفات مس + هیدروکسید کلسیم)	-	-	سولفات مس + هیدروکسید کلسیم میکرونیزه	-	بیماری غربالی	درختان میوه	۷ روز	۱ کیلو گرم سولفات مس ۵ آبه + ۱/۲۵ کیلو گرم هیدروکسید کلسیم در ۱۰۰ لیتر آب برای سمپاشی با HV	۴۷/۱۰/۱
۸۱	بردو (مخلوط بردو: پیک دوتایی سولفات مس + هیدروکسید کلسیم)	-	-	سولفات مس + هیدروکسید کلسیم میکرونیزه	-	پیچیدگی برگ	هلو	۷ روز	۱ کیلو گرم سولفات مس ۵ آبه + ۱/۲۵ کیلو گرم هیدروکسید کلسیم در ۱۰۰ لیتر آب برای سمپاشی با HV	۴۷/۱۰/۱

۴۷/۱۰/۱	۴ کیلو گرم سولفات مس ۵ آبه +۲ کیلو گرم هیدروکسید کلسیم در ۱۰۰ لیتر آب برای سمپاشی با LV	۷ روز	درختان میوه سرد سیری	شانکر	-	سولفات مس+هیدروکسید کلسیم میکرونیزه	-	بردو (مخلوط بردو:پک دوتایی سولفات مس +هیدروکسید کلسیم)	۸۲
۴۷/۱۰/۱	۴ کیلو گرم سولفات مس ۵ آبه +۲ کیلو گرم هیدروکسید کلسیم در ۱۰۰ لیتر آب برای سمپاشی با LV	۷ روز	درختان میوه	بیماری غربالی	-	سولفات مس+هیدروکسید کلسیم میکرونیزه	-	بردو (مخلوط بردو:پک دوتایی سولفات مس +هیدروکسید کلسیم)	۸۳
۴۷/۱۰/۱	۴ کیلو گرم سولفات مس ۵ آبه +۲ کیلو گرم هیدروکسید کلسیم در ۱۰۰ لیتر آب برای سمپاشی با LV	۷ روز	هلو	پیچیدگی برگ	-	سولفات مس+هیدروکسید کلسیم میکرونیزه	-	بردو (مخلوط بردو:پک دوتایی سولفات مس +هیدروکسید کلسیم)	۸۴
۹۶/۱۱/۳۰	در سه مرحله	۷ روز	بادام	لکه آجری	-	سولفات مس+هیدروکسید کلسیم میکرونیزه	-	بردو (مخلوط بردو:پک دوتایی سولفات مس +هیدروکسید کلسیم)	۸۷
۹۹/۴/۳۰	۱۵ در هزار	۷ روز	زردالو	بیماری غربالی	فراوره-های طیف سبز	SC	۱۸٪	بردو طیف	۸۵
۱۴۰۰/۹/۱۵	۵ لیتر در هکتار	۳ روز	سیب زمینی	سفیدک داخلی	خزرم کود مانیکا ایتالیا	SC		MANIFLOW	۸۶
۹۹/۶/۲۴	۳ کیلوگرم در هکتار در تناوب با سایر قارچ کش های ثبت شده	۷ روز	خیار	سفیدک داخلی	خزرم کود	WP	۳۳٪	توتور	۸۸
۱۴۰۳/۶/۲۶	۶ در هزار	۷ روز	درختان میوه هسته دار	شانکر باکتریایی	گیاه	WP	۲۴٪	فانجی گارد	۸۹

۹۰	مخلوط بردو ۲۲/۵٪+سیموکسانیل ۳٪	فستیوال	۲۵/۵٪	WP	سبا کوشا کشت Lainco S A	سفیدک داخلی	سیب زمینی	۱۵ روز	۲ کیلوگرم در مراحل اولیه بیماری و ۲.۵ کیلوگرم در مراحل پیشرفته بیماری با مقدار آب مصرفی	۱۴۰۴/۲/۲۲
۹۱	بوسکالید ۲۵/۲٪+ پیراکلواستروبین ۱۲/۸٪	یونیلیس	۳۸٪	WG	بازرگانان سرای سپند پارس Shandong Kangqiao	سفیدک پودری	گوجه فرنگی	۳ روز	یک در هزار (حداکثر دو بار در سال)	۹۸/۱۰/۲۳
۹۲	بوسکالید ۲۵/۲٪+ پیراکلواستروبین ۱۲/۸٪	بلیس	۳۸٪	WG	ب آ اس اف	سفیدک پودری	هلو- شلیل	۷ روز	۰/۷ در هزار مناطق خشک، ۱ در هزار مناطق مرطوب	۸۹/۹/۲۹
۹۳	بوسکالید ۲۵/۲٪+ پیراکلواستروبین ۱۲/۸٪	بلیس	۳۸٪	WG	ب آ اس اف	سفیدک پودری	سیب درختی	۷ روز	۰/۷ در هزار و در تناوب با سایر قارچکش-ها و حداکثر دوبار در سال	۹۷/۱۲/۱۳
۹۴	بوسکالید ۲۶۷ گرم/کیلوگرم+ پیراکلواستروبین ۶۷ گرم/کیلوگرم	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	آلترناریا	پودری گوجه فرنگی	۳ روز	۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۹۴/۱۲/۱۰
۹۵	بوسکالید ۲۶۷ گرم/کیلوگرم+ پیراکلواستروبین ۶۷ گرم/کیلوگرم	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	آلترناریا	سیب زمینی	۳ روز	۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۹۵/۳/۱۷
۹۶	بوسکالید ۲۶۷ گرم/کیلوگرم+ پیراکلواستروبین ۶۷ گرم/کیلوگرم	سیگنوم	۳۴/۴٪	WG	ب آ اس اف	کپک خاکستری	توت فرنگی گلخانه	۳ روز	۱/۵ در هزار و در تناوب با سایر قارچ-کش-ها و حداکثر دوبار در سال	۹۸/۱۱/۲۸
۹۷	بوسکالید ۲۶۷ گرم/کیلوگرم+ پیراکلواستروبین ۶۷ گرم/کیلوگرم	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	افتادگی برگ	کاهو	۳ روز	۱/۵ کیلو گرم در هکتار حداکثر دو مرحله و با رعایت فاصله ۱۴ روز تا برداشت استفاده شود.	۹۹/۳/۱۲

۹۸	بوسکالید ۲۶۷ گرم/کیلوگرم + پیراکلوستروبین ۶۷ گرم/کیلوگرم	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	کپک خاکستری	خیار	۳ روز	۱/۲۵ در هزار	۱۴۰۰/۷/۲۶
۹۹	بوسکالید ۲۶۷ گرم/کیلوگرم + پیراکلوستروبین ۶۷ گرم/کیلوگرم	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	سوختگی استمفیومی برگ	سیر	۱۵ روز	۱۲۰۰ گرم در هکتار با فاصله ۷-۱۰ روز به صورت متناوب	۱۴۰۳/۴/۱۱
۱۰۰	بوسکالید ۲۶۷ گرم/کیلوگرم + پیراکلوستروبین ۶۷ گرم/کیلوگرم	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	کپک خاکستری	فلفل گلخانه ای	۳ روز	۱ در هزار	۱۴۰۳/۷/۱۶
۱۰۱	بوسکالید ۲۶۷ گرم/کیلوگرم + پیراکلوستروبین ۶۷ گرم/کیلوگرم	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	لکه برگی آلترناریایی	پسته	۲۸ روز	۰/۵ در هزار	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۰۲	بوسکالید ۲۰۰ گرم/کیلوگرم + کرزوکسیم متیل ۱۰۰ گرم/کیلوگرم	کولیس	۳۰٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	هلو- شلیل	۷ روز	۰/۵ در هزار	۸۹/۹/۲۹
۱۰۳	بوسکالید ۲۰۰ گرم/کیلوگرم + کرزوکسیم متیل ۱۰۰ گرم/کیلوگرم	کولیس	۳۰٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	خیار	۳ روز	۰/۴ در هزار	۹۶/۹/۱۳
۱۰۴	بوسکالید ۲۰۰ گرم/کیلوگرم + کرزوکسیم متیل ۱۰۰ گرم/کیلوگرم	کولیس	۳۰٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	گوجه فرنگی (فضای باز)	۳ روز	۰/۵ در هزار	۹۸/۴/۱۰
۱۰۵	بوسکالید ۲۴٪+فلوودیوکسانیل ۶٪	-	۳۰٪	SC	شیمی پرتو نوین مامطیر Shandong Hailir Chemical	کپک خاکستری	انگور	۱۴ روز	۱/۵ در هزار	۱۴۰۵/۵/۲۶
۱۰۶	بی ترانول	بایکور	۲۵٪	WP	بایرکروپ ساینس	لکه سیاه	سیب	-	۰/۷۵ در هزار	۷۳/۴/۱۳
۱۰۷	بی کرنات پتاسیم	کالیبان	۸۵٪	SP	کیمپاسبز آور	سفیدک پودری	جالیز- گلخانه	-	۵ در هزار	۹۰/۱۲/۱

۱۰۸	پایدیفلومتوفن ۷۵ (آدپیدین) گرم/کیلوگرم+دیفنو کونا زول ۱۲۵ گرم/کیلوگرم	میراویس دیوو	۲۰٪	SC	سینجنتا	سفیدک پودری	انگور	۳ روز	۰/۷ در هزار	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۱۰۹	پایدیفلومتوفن ۷۵ (آدپیدین) گرم/کیلوگرم+دیفنو کونا زول ۱۲۵ گرم/کیلوگرم	میراویس دیوو	۲۰٪	SC	سینجنتا	سفیدک پودری	سیب	۷-۱۴ روز	۰/۸ در هزار	۱۴۰۲/۵/۳۰
۱۱۰	پروپامو کارب هیدروکلراید	پروپلنت	۷۲/۲٪	SL	اگریفار	بوته میری <i>Pythium aphnidermat um</i>	خیار	۳ روز	۱ در هزار در زمان کشت بذر و انتقال نشا و ۰/۷۵ در هزار دو هفته پس از انتقال نشا	۹۶/۱۱/۳۰
۱۱۱	پروپامو کارب هیدروکلراید ۴۰٪+ سیمو کسانیل ۵٪	ریوالدو	۴۵٪	SC	دلتا پارس نهاده آگریا	سفیدک داخلی	خیار	۳-۷ روز	۲ در هزار ۲ لیتر در هکتار در فضای باز	۱۴۰۰/۹/۲۹
۱۱۲	پروپامو کارب هیدروکلراید ۴۰٪+ سیمو کسانیل ۵٪	ریوالدو	۴۵٪	SC	دلتا پارس نهاده آگریا	سفیدک داخلی	گوجه فرنگی	۷ روز	۲ لیتر در هکتار و حداکثر دو بار محلول پاشی	۱۴۰۳/۹/۵
۱۱۳	پروپامو کارب هیدروکلراید ۴۰٪+ سیمو کسانیل ۵٪	پروکسانیل	۴۵٪	SC	اگریفار	سفیدک داخلی	سیب زمینی	۱۴ روز	۲/۵ لیتر در هکتار	۹۴/۷/۶
۱۱۴	پروپامو کارب هیدروکلراید ۶۲۵ گرم/لیتر + فلوپیکولید ۵۶۲ گرم /لیتر	اینفینیتو	۶۸/۷۵٪	SC	بایر آگ	سفیدک داخلی	خیار- گلخانه	۱ روز	۲ در هزار	۹۲/۸/۷
۱۱۵	پروپامو کارب هیدروکلراید ۶۲۵ گرم/لیتر + فلوپیکولید ۵۶۲ گرم /لیتر	اینفینیتو	۶۸/۷۵٪	SC	بایر آگ	سفیدک داخلی	سیب زمینی	۷ روز	۱/۲ لیتر در هکتار	۹۴/۷/۶

۹۲/۷/۸	۳ لیتر در هکتار در مزرعه به صورت شنی در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار ۰/۳ لیتر در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک	۳ روز	خیار	بوته میری	بایر آگ	SL	۸۴٪	پروپیکورانرژری (Previcur)	پروپامو کرب هیدرو کلراید ۵۳٪+ فوزتیل آلومینیوم ۳۱٪	۱۱۶
۷۷/۱۱/۲۶	۱ لیتر در هکتار به صورت محلول پاشی و در صورت آلودگی ۳۰٪ از ساقه های برنج	۳۰ روز	برنج	شیت بلایت	سینجنتا	EC	۲۵٪	تیلت	پروپیکونازول	۱۱۷
۷۷/۶/۹	۱ لیتر در هکتار حداقل یک نوبت سمپاشی در مرحله گلدهی و در صورت نیاز تکرار سمپاشی به فاصله ۷ روز	۳۰ روز	گندم	فوزاریوم خوشه	سینجنتا	EC	۲۵٪	تیلت	پروپیکونازول	۱۱۸
۷۵/۱/۲۷	۱ لیتر در هکتار (۹۶/۱۲/۱۳)	۳۰ روز	گندم	زنگ	سینجنتا	EC	۲۵٪	تیلت	پروپیکونازول	۱۱۹
۹۷/۱۲/۱۳	یک لیتر در هکتار بر اساس پیش آگاهی	۳۰ روز	گندم	زنگ زرد	بهاور شیمی آستک	EC	۲۵٪	بهتیل	پروپیکونازول	۱۲۰
۹۹/۶/۲۴	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	۲۱ روز	گندم	سپتوریوز	گیاه پرنیان اطلس Safa tarim	EC	۳۰٪	هاربور	پروپیکونازول ۱۵٪+ دیفنو کونازول ۱۵٪	۱۲۱
۸۲/۳/۱۹	۰/۳ لیتر در هکتار در مرحله تورم خوشه	۴۲ روز	گندم	زنگ زرد	سینجنتا	EC	۳۳٪	آرتنا	پروپیکونازول ۲۵٪+ سایپروکونازول ۸٪	۱۲۲

۱۲۳	پروپیکونازول ۲۵٪+سایپروکونازول ۸٪	آرتنا	۳۳٪	EC	سینجنتا	سپتوریوز	گندم	۴۲ روز	۰/۴ لیتر در هکتار در مرحله تورم خوشه و مشاهده اولین علائم	۸۳/۱۰/۳۱
۱۲۴	پروپیکونازول ۱۲/۵٪+فلوکسایپروکسادل ۳٪+پیراکلواستروبین ۲۰٪	اینور	۳۵/۵٪	EC	ب آ اس اف	زنگ زرد	گندم	۳۵ روز	نیم لیتر در هکتار	۹۷/۱۲/۱۳
۱۲۵	پروتیو کونازول ۲۵٪+تیبو کونازول ۱۵٪	لاماردور	۴۰٪	FS	بایر آگ	سیاهک پنهان معمولی	گندم	–	۱۰-۱۵ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	۸۹/۳/۱۰
۱۲۶	پروتیو کونازول ۲۵٪+تیبو کونازول ۱۵٪	لاماردور	۴۰٪	FS	بایر آگ	سیاهک آشکار	گندم	–	۲۰ میلی-لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	۸۹/۹/۱
۱۲۷	پروتیو کونازول ۲۵٪+تیبو کونازول ۱۵٪	لاماردور	۴۰٪	FS	بایر آگ	سیاهک آشکار	جو	–	۱۵ میلی-لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	۹۶/۴/۱۹
۱۲۸	پروتیو کونازول ۱۵٪+تیبو کونازول ۲٪	ردیگوپرو	۱۷٪	FS	بایر آگ	سیاهک آشکار	گندم	–	۰/۵ میلی لیتر در کیلوگرم بذر	۱۴۰۴/۲/۱
۱۲۹	پروتیو کونازول ۱۵٪+تیبو کونازول ۲٪	ردیگوپرو	۱۱۷٪	FS	بایر آگ	سیاهک پنهان	گندم	–	۰/۵ در هزار	۱۴۰۳/۲/۳
۱۳۰	پرکلراز	اسپورگون	۵۰٪	WP	بایر کروپ ساینس	پوسیدگی خشک	قارچ خوراکی	۱۰ روز	۰/۹ گرم در متر مربع	۸۴/۲/۱۹
۱۳۱	پرکلراز	آکورد	۵۰٪	WP	فرتی اگرو	پوسیدگی خشک	قارچ خوراکی	۱۰ روز	۰/۹ گرم در هر متر مربع	۹۲/۸/۲۷
۱۳۲	پنسیکرون	مونسرن	۲۵٪	FS	بایر آگ	شانکر ریزوکتونیایی ساقه و شوره سیاه	سیب زمینی	–	۱-۱/۲۵ در هزار (ضد عفونی بذر)	۹۹/۴/۳۰
۱۳۳	پنسیکرون	مونسرن	۲۵٪	WP	بایر آگ	شانکر ریزوکتونیایی ساقه و شوره سیاه	سیب زمینی	–	۱/۲۵ در هزار (ضد عفونی بذر)	۸۶/۲/۳

۱۳۴	پنفلوفن	امستوپرایم	۵٪	FS	بایر	شانکر ریزوکتونایی و شوره سیاه	سیب زمینی	-	۴۰۰ میلی لیتر برای ۱۰۰۰ کیلوگرم غده بذری به صورت ضد عفونی	۱۴۰۲/۴/۱۹
۱۳۵	پنکونازول	توپاز	۲۰٪	EW	سینجنتا	سفیدک پودری	انگور	۱۴ روز	۰/۱۲۵ در هزار	۷۹/۱۲/۱۵
۱۳۶	پیراکلواستروبین	سلتیما	۱۰٪	CS	BASF	بلاست	برنج	۳۵ روز	۱۰۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۳/۳/۲۱
۱۳۷	پیراکلواستروبین ۶/۷٪+ دیمتومورف ۱۲٪	پیرادیم	۱۸/۷٪	DF	برزگر برجسته جیانگ سوگرین سای	سفیدک داخلی	خیار(گلخانه)	۳ روز	۰/۳۵ در هزار (بیش از سه نوبت متوالی و بیش از شش نوبت در یک دوره تولید ممنوع است).	۹۷/۱۰/۱۷
۱۳۸	پیراکلواستروبین ۶/۷٪+ دیمتومورف ۱۲٪	پیرادیم	۱۸/۷٪	DF	برزگر برجسته Jiangsu Greenscie Chemical	سوختگی الترناریایی	پسته	-	۰/۷۵ در هزار	۱۴۰۱/۴/۲۰
۱۳۹	پیراکلواستروبین ۱۵٪+ فلوکساپیروکساد ۷/۵٪	پریاکسور	۲۲/۵٪	EC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	گندم	۳۵ روز	۱/۵ لیتر در هکتار	۹۹/۳/۱۲
۱۴۰	پیری متانیل	میلیس	۳۰٪	SC	گیاه پرنیان اطلس Safa tarim	کپک خاکستری	توت فرنگی گلخانه	-	یک در هزار و در تناوب با سایر قارچ-کشها و حداکثر دوبار در سال	۹۸/۱۱/۲۸
۱۴۱	پیری متانیل ۱۸۷/۲ گرم/لیتر+روغن	۲۰۰۰ لیتر		EC	دانش میوه خاورمیانه	کپک سیاه	مرکبات	-	۰/۰۵ در هزار	۱۴۰۳/۳/۲۱

ردیف	نام محصول	نوع	شرکت	نوع سبب	مرببات	سوز سر سر	تاریخ
۱۴۲	پیری متانیل ۱۸۷/۲ گرم/لیتر+روغن میخک ۱۸۵ گرم/لیتر	زداتان ۲۰	EC	دانش میوه خاورمیانه فرانسه Xeda	پیشگیری کننده و درمان کننده	گلایی	۱۴۰۳/۱۱/۱۵
۱۴۳	پیری متانیل ۱۸۷/۲ گرم/لیتر+روغن میخک ۱۸۵ گرم/لیتر	زداتان ۲۰	EC	دانش میوه خاورمیانه فرانسه Xeda	پوسیدگی های پس از برداشت	سیب درختی	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۴۴	پیری متانیل ۰/۱۴٪ + صمغ گیاهی کارنوبا ۱۹٪	مکسی فرش	واکس آماده مصرف	دانش میوه خاورمیانه پیری متانیل تولید شرکت xeda فرانسه	کپک سبز	مرکبات	۱۴۰۳/۳/۲۱
۱۴۵	<i>Pythium Oligandrum</i> Drechsler	پلی ورسوم	WP	بازارگان کالا Biopreparaly	عامل پیشگیرانه بیماری گیاهچه میری	خیار گلخانه	۱۴۰۰/۹/۱۵
۱۴۶	تالارومیسس فلاووس	تالارومین	۱۰۹	ذرات جامد قابل انتشار در آب	بهاران دشت ساحل	سیب زمینی	۹۷/۲/۳۰
۱۴۷	تبوکونازول	فولیکور	۲۵٪	EW	بایر آگ	پوسیدگی اسکلروتینیایی	۹۴/۳/۱۱
۱۴۸	تبوکونازول	فولیکور	۲۵٪	EW	بایر کروب ساینس	زنگ زرد	۷۵/۱/۲۷
۱۴۹	تبوکونازول	راکسیل	۶٪	FS	بایر کروب ساینس	سیاهک پنهان معمولی	۷۷/۱۱/۱۲

۱۵۰	تبو کونازول	راکسیل	۲٪	DS	بایر کروب ساینس	سیاهک اشکار	گندم		۱/۵ در هزار	۷۸/۴/۱۴
۱۵۱	تبو کونازول	آرتمیس	۶٪	FS	بیسترفیلد	سیاهک پنهان معمولی	گندم	-	۵۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	۹۵/۹/۲۹
۱۵۲	تبو کونازول	تبوکور	۲۵٪	EW	گل سم گرگان نینگ پوسانجوی	زنگ زرد	گندم	-	یک لیتر در هکتار	۹۷/۱۲/۱۳
۱۵۳	تبو کونازول	تایدتئو	۴۰٪	SC	گیاه پر نیان اطلس تاید کراپ-ساینس	زنگ زرد	گندم	۳۵ روز	۰/۴ لیتر در هکتار	۹۷/۱۲/۱۳
۱۵۴	تبو کونازول ۱۰٪+سولفور ۶۵٪	تيازو	۷۵٪	WDG	اسپیدار پردیس Excell Crop Care Limited	سفیدک پودری	انگور	۱۴ روز	۲ در هزار	۱۴۰۴/۵/۱۳
۱۵۵	تتراکونازول	لوسپل	۱۲/۵٪	LS	ایزاگرو	سیاهک اشکار	گندم	-	۱۰۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلوگرم بذر	۸۹/۱۰/۱۳
						سیاهک پنهان			۳۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلوگرم بذر	
۱۵۶	تبو کونازول ۲۰٪+ آزوکسی استروبین ۱۲٪	آذیلون	۳۳٪	SC	آریاشیمی Ningbo Sunjoy Jiangsu	سفیدک پودری	رز	-	یک در هزار	۹۸/۱۰/۲۳
					ساعی گل تهران					

۱۵۷	تیوکونازول ۲۳٪ + پیراکلواستروبین ۱۱/۵٪	پیلار تب	۳۴/۵٪	SC	Jiangsu Mindleader crop science	سفیدک پودری	گندم	-	۰/۶ لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۹/۱
۱۵۸	تتراکونازول ۸٪+آزوکسی استروبین ۱۰٪	آفیانس	۱۸٪	SC	بازرگان کالا Isagro	سفیدک پودری	هلو	-	۰/۶ در هزار	۱۴۰۱/۴/۲۰
۱۵۹	تتراکونازول ۸٪+آزوکسی استروبین ۱۰٪	آفیانس	۱۸٪	SC	بازرگان کالا Isagro	لکه موجی	گوجه فرنگی	۳ روز	۶۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۱۶۰	تتراکونازول	دومارک	۱۰٪	EC	Isagro	سفیدک پودری	جالیز	۳ روز	۰/۵ لیتر در هکتار در مزرعه	۸۸/۸/۱۱
									۰/۴ در هزار در گلخانه	
۱۶۱	تتراکونازول	دومارک	۱۰٪	EC	Isagro	سفیدک پودری	سیب	۱۴ روز	۰/۳ در هزار	۹۲/۳/۲۷
۱۶۲	تتراکونازول	لوسپل	۱۲/۵٪	LS	ایزاگرو	سیاهک آشکار	گندم	-	۱۰۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلو گرم بذر	۸۹/۱۰/۱۳
						سیاهک پنهان		-	۳۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلو گرم بذر	
۱۶۳	تتراکونازول	امی نت	۱۲/۵٪	ME	Isagro	سفیدک پودری	چغندر قند	۲۱ روز	۰/۸-۱ لیتر در هکتار	۹۰/۷/۴
۱۶۴	تری تیکونازول	رنال	۲۰٪	FS	ب آ اس اف	سیاهک آشکار	جو	-	۲۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلو گرم بذر	۸۹/۳/۱۰

۱۶۵	تری تیکونازول	رئال اف اس ۲۰۰	۲۰٪	FS	بایر کروپ ساینس	سیاهک پنهان معمولی	گندم	-	۲۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلو گرم بذر	۷۷/۱۱/۱۲
۱۶۶	تری دیمورف	کالکسین	۷۵٪	EC	ب آ اس اف	سفیدک حقیقی	چغندر قند		۰/۷۵ لیتر در هکتار از اوایل تیرماه به بعد	۵۶/۶/۷
۱۶۷	تری سیکلازول	بیم	۷۵٪	WP	داو اگرو ساینس	بلاست	برنج	۳۵ روز	محلول پاشی ۰/۵ کیلو گرم از ظهور ۳۰-۴۰ درصد از خوشه ها	۶۶/۸/۴
۱۶۸	تری فلوکسی استروبین	فلینت	۵۰٪	WG	بایر آ گ	سفیدک پودری	جالیز (خیار در مزرعه)	۱ روز	۲۰۰ گرم در هکتار	۸۸/۸/۱۱
۱۶۹	تری فلوکسی استروبین	فلینت	۵۰٪	WG	بایر آ گ	لکه سیاه	سیب	۷ روز	۰/۲ در هزار	۸۳/۸/۱۱
۱۷۰	تری فلوکسی استروبین	فلینت	۵۰٪	WG	بایر آ گ	سفیدک پودری	سیب	۷ روز	۰/۲ در هزار	۸۲/۴/۹
۱۷۱	تری فلوکسی استروبین	فلینت	۵۰٪	WG	بایر آ گ	سفیدک پودری	گوجه فرنگی - مزرعه	۱ روز	۲۵۰ گرم در هکتار	۹۶/۵/۲
۱۷۲	تری فلوکسی استروبین ۱۴٪+پوسکالید ۴۲٪		۵۶٪	SC	ناردان توسعه یزد Jingbo Agrochemicals Technology	سفیدک پودری	انگور	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۱۴۰۳/۵/۲۲
۱۷۳	تری فلوکسی استروبین ۲۵٪+ تیبوکونازول ۵۰٪	ناتیوو	۷۵٪	WG	بایر آ گ	بلاست	برنج	۲۱ روز	۱۶۰ گرم در هکتار	۹۲/۳/۶
۱۷۴	تری فلوکسی استروبین ۲۵٪+ تیبوکونازول ۵۰٪	ناتیوو	۷۵٪	WG	بایر آ گ	لکه سیاه	سیب	۱۴ روز	۰/۳-۰/۲ در هزار	۹۴/۵/۱۲
۱۷۵	تری فلوکسی استروبین ۲۵٪+ تیبوکونازول ۵۰٪	ناتیوو	۷۵٪	WG	بایر آ گ	سفیدک پودری	سیب	۱۴ روز	۰/۳ در هزار	۹۵/۶/۱

۱۷۶	تری فلوکسی استروبین ۲۵٪+ تبوکونازول ۵۰٪	ناتیوو	۷۵٪	WG	بایر آگ	سفیدک پودری	چغندر قند	-	۲۰۰ گرم در هکتار	۹۵/۶/۱
۱۷۷	تری فلوکسی استروبین ۲۵٪+ تبوکونازول ۵۰٪	ناتیوو	۷۵٪	WG	بایر آگ	شیت بلایت	برنج	۲۱ روز	۱۶۰ گرم در هکتار	۹۶/۹/۱۳
۱۷۸	تری فلوکسی استروبین ۲۵٪+ تبوکونازول ۵۰٪	اوت (evet)	۷۵٪	WG	گل سم گرگان	بلاست	برنج	۲۱ روز	۱۶۰ گرم در هکتار	۹۸/۱۱/۱۴
۱۷۹	تری فلوکسی استروبین ۲۵٪+ تبوکونازول ۵۰٪	فلونازول	۷۵٪	WG	بازرگانان سرای سپند پارس	بلاست	برنج	-	۱۶۰ گرم در هکتار	۹۸/۱۱/۱۴
					CAC Nantong					
۱۸۰	تری فلوکسی استروبین ۱۲/۵٪+ تبوکونازول ۲۵٪	تیلما	۳۷/۵٪	SC	پاک سم ایرانیان	بلاست	برنج	-	۳۲۰ میلی لیتر در هکتار	۹۸/۱۱/۱۴
					&sunjoy CAC Nanton					
۱۸۱	تری فلوکسی استروبین ۲۵٪+ فلوپیرام ۲۵٪	لونا سن سیشن	۵۰٪	SC	بایر آگ	سفیدک پودری	سیب	۱۴ روز	۰/۲ در هزار	۹۶/۲/۲۵
۱۸۲	تری فلوکسی استروبین ۲۵٪+ فلوپیرام ۲۵٪	لونا سن سیشن	۵۰٪	SC	بایر آگ	لکه سیاه	سیب	۱۴ روز	۰/۲ در هزار	۹۶/۳/۱
۱۸۳	تری فلوکسی استروبین ۲۵٪+ فلوپیرام ۲۵٪	لونا سن سیشن	۵۰٪	SC	بایر آگ	سفیدک پودری	خیار-گلخانه	۳ روز	۰/۲ در هزار	۹۶/۳/۱
۱۸۴	تری فلوکسی استروبین ۲۵٪+ فلوپیرام ۲۵٪	لونا سن سیشن	۵۰٪	SC	بایر آگ	سفیدک پودری	گوچه فرنگی- مزرعه	۵ روز	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۵/۲
۱۸۵	تری فلوکسی استروبین ۲۵٪+ فلوپیرام ۲۵٪	لونا سن سیشن	۵۰٪	SC	بایر آگ	کپک خاکستری	خیار	-	۰/۴ در هزار	۱۴۰۰/۷/۲۶
۱۸۶	تری فلو میزول	تریفمین	۱۵٪	EC	نیون سودا	سفیدک پودری	سیب	-	یک در هزار	۹۹/۱۰/۹

۱۸۷	تری فلومیزول	تریفمین	۱۵٪	EC	نیپون سودا	پوسیدگی طوقه	برنج		۳۳ میلی لیتر برای ضد عفونی ۱۰۰ کیلو بذر (منحصرا برای کاربرد در شمال کشور)	۸۱/۴/۱۰
۱۸۸	تری فلومیزول ۱۵٪ + سایفلوفنامید ۳/۴٪	پانچو تی اف	۱۸/۴٪	WG	رها اندیش کاوان	سفیدک پودری	هلو	۱۴ روز	۷۵ / ۰ در هزار	۹۹/۱۰/۱
۱۸۹	تری فلومیزول ۱۵٪ + سایفلوفنامید ۳/۴٪	پانچو تی اف	۱۸/۴٪	WG	نیپون سودا	مومیایی	هلو	۱۴ روز	۷۵ / ۰ در هزار	۱۴۰۰/۴/۱۴
۱۹۰	تریتیو کونازول ۸٪ + پیراکلواستروبین ۴٪	اینشورپرفرم	۱۲٪	FS	ب آ اس اف	سیاهک پنهان معمولی	گندم	-	۰/۵ - ۰/۴ در هزار	۹۸/۱۲/۲۸
۱۹۱	تریتیو کونازول ۸٪ + پیراکلواستروبین ۴٪	اینشورپرفرم	۱۲٪	FS	ب آ اس اف	سیاهک آشکار	گندم	-	۰/۵ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱
۱۹۲	تریتیو کونازول ۸٪ + پیراکلواستروبین ۴٪	اینشورپرفرم	۱۲٪	FS	ب آ اس اف	فوزاریوم بذر زاد	ذرت دانه ای		۲۰۰ میلی لیتر در ۱۰۰ کیلو گرم بذر به روش ضد عفونی قبل از کاشت	۱۴۰۵/۵/۲۶
۱۹۳	تریفورین	ساپرول	۱۹٪	DC	سومیتومو	لکه آجری	بادام	-	۰/۳ در هزار	۹۶/۱۱/۳۰
۱۹۴	تریکودرما هارزینانوم	تریانوم پی	۱۰ ^۹	P	گیاه کوپرت هلند	پژمردگی فوزاریومی	گوجه فرنگی گلخانه	ندارد	۴۰-۳۰ گرم برای هزار گیاه	۹۱/۲/۹
۱۹۵	تریکودرما هارزینانوم	تریانوم پی	۱۰ ^۹	WP	گیاه کوپرت هلند	پژمردگی فوزاریومی	خیار گلخانه	ندارد	۴۰-۳۰ گرم برای هزار گیاه	۹۱/۲/۹
۱۹۶	تریکودرما هارزینانوم	تریانوم جی	۱۰ ^۹	G	گیاه کوپرت هلند	پژمردگی فوزاریومی	طالبی	ندارد	۲۰-۱۵ کیلو گرم در هکتار	۹۷/۹/۲۱
۱۹۷	تریکودرما هارزینانوم	تریانوم جی	۱۰ ^۸	G	گیاه کوپرت هلند	پژمردگی فوزاریومی	گوجه فرنگی گلخانه	ندارد	۳۷۵-۲۵۰ گرم در متر مکعب	۹۷/۹/۲۱
۱۹۸	سه جدایه موتانت تریکودرما	-	۱۰ ^۸	WP	پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای	پوسیدگی زغالی	سویا	ندارد	۱/۵ کیلو گرم با ۳۰۰ لیتر آب در هکتار	۱۴۰۳/۳/۲۱

۱۹۹	تیابندازول	تکتو	۶۰٪	WP	سینجنتا	مرگ گیاهچه	حبوبات	۲ در هزار به طریق ضد عفونی بذر	۵۳/۶/۳۰
۲۰۰	تیابندازول	تکتو	۶۰٪	WP	سینجنتا	بیماری انبار	مرکبات	۱-۱/۵ در هزار به طریق ضد عفونی بذر	۵۳/۶/۳۰
۲۰۱	تیابندازول ۲/۵٪ + فلوتریافول ۲/۵٪	وینسیت پی	۵٪	DS	زنکا	سیاهک پنهان	گندم	۲ در هزار به طریق ضد عفونی بذر	۷۰/۳/۶
۲۰۲	تیفلوزامید	آچمز	۲۴٪	SC	گروه شهر سبز و سلامت پارسیان Shandong kangqiao	سوختگی غلاف برگ برنج(شیت بلایت)	برنج	۳۰۰ سی سی در هکتار در تناوب با سایر قارچ کش ها	۹۹/۳/۲۶
۲۰۳	تیوفانات متیل	توپسین ام	۷۰٪	WP	نیپون سودا	سیاهک پنهان و آشکار	گندم	۱۵۰ گرم برای یکصد کیلوگرم بذر	۵۰/۳/۲۳
۲۰۴	تیوفانات متیل	توپسین ام	۷۰٪	WP	نیپون سودا	پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه	درختان میوه سرد سیری	۵۰-۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب نزدیک طوقه درخت	۵۰/۳/۲۳
۲۰۵	تیوفانات متیل	توپسین ام	۷۰٪	WP	نیپون سودا	سفیدک پودری	درختان میوه	۵۰-۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب	۵۰/۳/۲۳
۲۰۶	تیوفانات متیل	توپسین ام	۷۰٪	WP	نیپون سودا	پوسیدگی قهوه ای	هلو	۵۰-۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب	۵۰/۳/۲۳
۲۰۷	تیوفانات متیل	توپسین ام	۷۰٪	WP	نیپون سودا	لکه سیاه	سیب	۵۰-۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب	۵۰/۳/۲۳
۲۰۸	تیوفانات متیل	توپسین ام	۷۰٪	WP	نیپون سودا	لکه سیاه	گلابی	۵۰-۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب	۵۰/۳/۲۳
۲۰۹	تیوفانات متیل	توپسین ام	۷۰٪	WP	نیپون سودا	لکه سفید	گلابی	۵۰-۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب	۵۰/۳/۲۳
۲۱۰	تیوفانات متیل	توپسین ام	۷۰٪	WP	نیپون سودا	پوسیدگی سفید ریشه	درختان میوه	۵۰-۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب نزدیک طوقه درخت	۵۰/۳/۲۳
۲۱۱	تیوفانات متیل ۳۵٪ +تری سیکلازول ۳۷/۵٪	ویستا	۷۲/۵٪	WP	نیپون سودا ژاپن	بلاست برگ و خوشه	برنج	۴-۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۹۰/۳/۳۰

۲۱۲	تیوفانات متیل ۵۰٪+تیرام ۳۰٪	همای کت	۸۰٪	WP	نیپون سودا ژاپن	پوسیدگی طوقه	برنج		۳ گرم سم برای هر کیلو بذر فقط در مناطق برنج کاری شمال کشور	۸۰/۸/۲۸
۲۱۳	۱۰٪ روغن سیر (۰/۰۳٪ آلیسین)+۳٪ اسانس میخک (۲/۲٪ اوژنول)	میلدیوکات Mildew Cut	۱۳٪	EC	پژوهشکده گیاهان دارویی	سفیدک پودری	خیار گلخانه ای	-	۵ در هزار	۱۴۰۳/۱۲/۱۱
۲۱۴	روغن میخک ۱۰٪+صمغ گیاهی کارنوبا ۹۰٪	Fresh Save HN		EC	دانش میوه خاورمیانه	پیشگیری کننده و درمان کننده کپک خاکستری	گلابی	-	۷ در هزار	۱۴۰۳/۱۱/۱۵
۲۱۵	روغن میخک ۱۰٪+صمغ گیاهی کارنوبا ۹۰٪	Fresh Save HN		EC	دانش میوه خاورمیانه	پیشگیری کننده و درمان کننده	سیب (رقم گلدن دلشز)	-	۸ در هزار	۱۴۰۵/۳/۱۸
۲۱۶	دودین	ملپرکس	۶۵٪	WP	ب آ اس اف	لکه سیاه	سیب		۱ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۱۷	دیتیانون	دلان	۵۰٪	SC	ب آ اس اف	لکه سیاه	سیب	۴۵ روز	۰/۷۵ در هزار	۱۴۰۲/۵/۳۰
۲۱۸	دیفنوکونازول	دیویدند	۳٪	DS	سینجنتا	سیاهک پنهان پا کوتاه	گندم		۲۰۰ گرم برای ۱۰۰ کیلو بذر	۷۷/۸/۴
۲۱۹	دیفنوکونازول	دیویدند	۳٪	DS	سینجنتا	سیاهک پنهان معمولی	گندم		۱ در هزار برای ضد عفونی بذر	۷۸/۳/۱۷
۲۲۰	دیفنوکونازول	دیویدند	۳٪	DS	سینجنتا	سیاهک آشکار	گندم		۲ در هزار	۷۸/۴/۱۴
۲۲۱	دیفنوکونازول	دیویدند ام ۰۳۰	۳٪	FS	سینجنتا	سیاهک پنهان معمولی	گندم		۱ در هزار برای ضد عفونی بذر	۷۹/۹/۳۱
۲۲۲	دیفنوکونازول	دیویدند ام ۰۳۰	۳٪	FS	سینجنتا	سیاهک پنهان پا کوتاه	گندم		۱ در هزار برای ضد عفونی بذر	۸۶/۲/۳
۲۲۳	دیفنوکونازول ۳٪+ سایپرو کونازول ۰/۶۳٪	دیویدند استار	۳/۶۳٪	FS	سینجنتا	سیاهک آشکار	جو	-	۲۰۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	۸۹/۳/۱۰
۲۲۴	دیفنوکونازول ۳٪+ سایپرو کونازول ۰/۶۳٪	دیویدند استار	۳/۶۳٪	FS	سینجنتا	سیاهک آشکار	گندم	-	۱۰۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	۸۹/۹/۱

۲۲۵	دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/لیتر+ سیفلوفنامید ۱۵ گرم/لیتر	سیدلی تاپ	۱۴٪	DC	سینجنتا	سفیدک پودری	خیار در شرایط گلخانه ای	۷-۱۴ روز	۱ در هزار (عدم کاربرد بیش از دو نوبت در طول یک فصل)	۹۷/۸/۱۴
۲۲۶	دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/لیتر+ سیفلوفنامید ۱۵ گرم/لیتر	سیدلی تاپ	۱۴٪	DC	سینجنتا	سوختگی استمفیلیومی برگ	سیر	۱۵ روز	۱۰۰۰ میلی لیتر در هکتار با فاصله ۷-۱۰ روز به صورت متناوب	۱۴۰۳/۴/۱۱
۲۲۷	دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/لیتر+ سیفلوفنامید ۱۵ گرم/لیتر	سیدلی تاپ	۱۴٪	DC	سینجنتا	سفیدک پودری	سیب	۱۴-۲۸ روز	۰/۷۵ در هزار	۱۴۰۴/۲/۱
۲۲۸	دیفنو کونازول ۵۰ گرم/لیتر+ فلوکساپیروکساد ۷۵ گرم/لیتر(xemium)	داگونیس	۱۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	خیار گلخانه ای	۳ روز	۰/۵ در هزار	۹۹/۱۰/۲۲
۲۲۹	دیفنو کونازول ۵۰ گرم/لیتر+ فلوکساپیروکساد ۷۵ گرم/لیتر(xemium)	داگونیس	۱۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	سیب	۳ روز	۰/۶ در هزار	۱۴۰۰/۹/۲۲
۲۳۰	دیفنو کونازول ۵۰ گرم/لیتر+ فلوکساپیروکساد ۷۵ گرم/لیتر(xemium)	داگونیس	۱۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	لکه سیاه سیب	سیب	۳ روز	۰/۶ در هزار	۱۴۰۰/۱۲/۹
۲۳۱	دیفنو کونازول ۵۰ گرم/لیتر+ فلوکساپیروکساد ۷۵ گرم/لیتر(xemium)	داگونیس	۱۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	لکه موجی	سیب زمینی	۷ روز	۷۵۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۷/۲۵
۲۳۲	دیفنو کونازول ۵۰ گرم/لیتر+ فلوکساپیروکساد ۷۵ گرم/لیتر(xemium)	داگونیس	۱۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	لکه موجی	گوجه فرنگی	۳ روز	۱۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۲۳۳	دیفنو کونازول ۵۰ گرم/لیتر+ فلوکساپیروکساد ۷۵ گرم/لیتر(xemium)	داگونیس	۱۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	توت فرنگی	۱ روز	۰/۶ در هزار	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۲۳۴	دیفنو کونازول ۵۰ گرم/لیتر+ فلوکساپیروکساد ۷۵ گرم/لیتر(xemium)	داگونیس	۱۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	گوجه فرنگی	۳ روز	۶۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۳/۴/۱۱

۲۳۵	دینوکاپ	کاراتان اف ان ۵۷	۱۸/۲۵٪	WP	داو اگرو ساینس	سفیدک پودری	هلو	۲۱ روز	۱ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۳۶	دینوکاپ	کاراتان اف ان ۵۷	۱۸/۲۵٪	WP	داو اگرو ساینس	سفیدک پودری	سیب	۲۱ روز	۱ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۳۷	دینوکاپ	کاراتان اف ان ۵۷	۱۸/۲۵٪	WP	داو اگرو ساینس	سفیدک پودری	انگور	۲۱ روز	۱ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۳۸	دینوکاپ	کاراتان اف ان ۵۷	۱۸/۲۵٪	WP	داو اگرو ساینس	سفیدک پودری	یونجه		۰/۵-۱ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۳۹	دینوکاپ	کاراتان اف ان ۵۷	۱۸/۲۵٪	WP	داو اگرو ساینس	سفیدک پودری	سبزی و جالیز	۷ روز	۱-۲ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۴۰	دینوکاپ	کاراتان ال سی	۴۸٪	EC	داو اگرو ساینس	سفیدک پودری	توتون		۱ در هزار	۷۹/۷/۱۱
۲۴۱	دینوکاپ	کاراتان ال سی	۴۸٪	EC	داو اگرو ساینس	سفیدک پودری	رز		۰/۵-۱ در هزار	۷۹/۷/۱۱
۲۴۲	دینوکاپ	کاراتان ال سی	۴۸٪	EC	داو اگرو ساینس	سفیدک پودری	اشجار و گیاهان غیر مثمر		۰/۵-۱ در هزار	۷۹/۷/۱۱
۲۴۳	دیمتورف ۷/۲٪ + پیراکلوستروبین ۴٪	کابریو دو	۱۱/۲٪	EC	ب آ اس اف	آلترناریا	گوجه فرنگی	۳ روز	۲ لیتر در هکتار	۹۴/۱۲/۱۰
۲۴۴	دیمتورف ۹٪ + مانکوزب ۶۰٪	آکرویات ام زد	۶۹٪	WG	ب آ اس اف	سفیدک داخلی	سیب زمینی	۷ روز	۲ کیلوگرم در هکتار	۹۴/۸/۲۵
۲۴۵	سایپروکونازول	التو	۱۰٪	SL	سینجنتا	زنگ	گندم	۴۲ روز	۰/۵ در هکتار	۷۴/۱۲/۱۴
۲۴۶	سایپروکونازول ۱۲٪ + کاربندازیم ۳۰٪	آلتو کمی	۴۲٪	SC	سینجنتا	پوسیدگی اسکلروتیایی	ساقه کلزا	۴۲ روز	۱ لیتر در هکتار	۹۴/۳/۱۱
۲۴۷	سایپروکونازول ۱۲٪ + کاربندازیم ۳۰٪	آلتو کمی	۴۲٪	SC	سینجنتا	فوزاریوم	سنبله گندم	۴۲ روز	۰/۵ لیتر در هکتار	۸۳/۲/۲۸
۲۴۸	سولفات مس ۱۰/۲٪ + فسفیت پتاسیم ۵۱/۹٪	سراکوئینت	۶۲/۱٪	SP	سرادیس رهروان رویش سبز	کپک خاکستری	توت فرنگی	-	۳ در هزار در شروع رشد گیاه به صورت محلولپاشی دور خاک بوته	۹۸/۱۰/۹

۲۴۹	سولفور	کومولوس	۸۰٪	DF	BASF	سفیدک پودری	انگور		۳ در هزار	۸۰/۱۱/۸
۲۵۰	سولفور	کومولوس	۸۰٪	DF	BASF	سفیدک پودری	خیار		۳ کیلوگرم در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۵۱	سولفور	تیوویت جت	۸۰٪	WG	سینجنتا	سفیدک پودری	چغندر		۴ کیلوگرم در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۵۲	سولفور	تیوویت جت	۸۰٪	WG	سینجنتا	سفیدک حقیقی	سبزی		۲-۳ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۵۳	سولفور	تیوویت جت	۸۰٪	WG	سینجنتا	سفیدک پودری	هلو		۳-۴ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۵۴	سولفور	تیوویت جت	۸۰٪	WG	سینجنتا	سفیدک پودری	سیب		۳-۴ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۵۵	سولفور	تیوویت جت	۸۰٪	WG	سینجنتا	سفیدک پودری	رز و گیاهان زینتی و غیر مثمر		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۵۶	سولفور	تیوویت جت	۸۰٪	WG	سینجنتا	سفیدک پودری	یونجه		۲-۳ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۵۷	سولفور	سولفولاک	۸۰٪	WG	بیستر فیلد	سفیدک پودری	خیار	۱ روز	۳ کیلوگرم در هکتار	۹۲/۴/۱۷
۲۵۸	سولفور	گوگرد سمیران	۸۰٪	SC	سمیران	سفیدک پودری	انگور	-	۲/۵ در هزار	۹۲/۸/۲۷
۲۵۹	سولفور	سولفور ارکیده سازان	۴۰٪	SC	ارکیده سازان	سفیدک پودری	شلیل	۲۰ روز	۳/۷۵ در هزار	۹۳/۶/۱۰
۲۶۰	سولفور	پارومی دی	۸۰٪	DF	آریا شیمی کروماندل	سفیدک پودری	خیار گلخانه	۱ روز	۳ در هزار با مشاهده اولین علائم و در تناوب با	۹۹/۳/۱۲
۲۶۱	سولفور	سولفیکس	۸۰٪	SC	باغبان تاک	سفیدک پودری	انگور	۲۰ روز	۲/۵ در هزار	۹۸/۳/۲۷
۲۶۲	سولفور میکرونیزه		۸۰-۹۰٪	P		سفیدک پودری	انگور	۲۰ روز	۶۰-۹۰ کیلوگرم در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۳	سیازوفامید	رانمن	۴۰٪	SC	ایشیهارا	سفیدک داخلی	خیار- گلخانه	۳ روز	۰/۴-۰/۵ در هزار	۹۱/۳/۸
۲۶۴	سیازوفامید	رانمن	۴۰٪	SC	ایشیهارا	بازدگی	سیب زمینی	۷ روز	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۴/۷/۶
۲۶۵	سیازوفامید	رانمن	۱۰٪	SC	ایشیهارا	سفیدک داخلی	خیار- گلخانه	۳ روز	۱/۵ در هزار	۹۶/۵/۲

۹۷/۱۰/۱۷	۰/۶ در هزار (بیش از سه نوبت متوالی و بیش از شش نوبت در یک دوره تولید ممنوع است).	۳ روز	خیار(گلخانه)	سفیدک داخلی	بازرگانان سرای سپند پارس	SC	۲۰٪	رگنانت	سیازوفامید	۲۶۶
					شاندوگ هایلر					
۱۴۰۱/۱۱/۳	۱ در هزار	۱۴ روز	انگور	پوسیدگی خاکستری	آتیه نگین فلات	WG	۵۰٪	سیپرودین	سیپرودینیل	۲۶۷
					Shaanxi hengrun chemical industry					
۱۴۰۲/۵/۹	۱ در هزار	۳ روز	گوجه فرنگی	نکروز ساقه	سینجنتا	WG	۶۲/۵٪	سویچ	سیپرودینیل ۳۷/۵٪+فلودیوکسانیل ۲۵٪	۲۶۸
۱۴۰۲/۵/۹	۰/۸ در هزار	۳ روز	توت فرنگی	کپک خاکستری	سینجنتا	WG	۶۲/۵٪	سویچ	سیپرودینیل ۳۷/۵٪+فلودیوکسانیل ۲۵٪	۲۶۹
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱ در هزار	۷ روز	خیار	کپک خاکستری	سینجنتا	WG	۶۲/۵٪	سویچ	سیپرودینیل ۳۷/۵٪+فلودیوکسانیل ۲۵٪	۲۷۰
۱۴۰۳/۱۰/۳	۲ در هزار	۲۱ روز	انگور	سفیدک کرکی	دلتا پارس نهاده	WG	۵۲/۱٪	کوفورس اکسترا	سیمو کسانیل ۶۰ گرم/کیلو گرم +هیدروکسید مس ۴۶۱ گرم/کیلو گرم	۲۶۹
					Zenith Crop Sciences Bulgaria					
۸۱/۱۲/۱۹	۲۰۰ گرم در هکتار	۳ روز	کدوئیان	سفیدک داخلی	دوپونت	WG	۵۲/۵٪	اکوشن پرو	فاموکسادون ۲۲/۵٪+ سیمو کسانیل ۳۰٪	۲۷۰
۸۱/۱۲/۱۹	۴۰۰ گرم در هکتار	۱۴ روز	سیب زمینی	سفیدک داخلی	دوپونت	WG	۵۲/۵٪	اکوشن پرو	فاموکسادون ۲۲/۵٪+ سیمو کسانیل ۳۰٪	۲۷۱

۹۷/۱۲/۱۳	۰/۴ کیلوگرم در هکتار	۳ روز	پیاز	سفیدک داخلی	خزر سم کود	WG	۵۲/۵٪	اکولایزر	فاموکسادون ۲۲/۵٪+ سیموکسانیل ۳۰٪	۲۷۲
	(مزرعه)				Zhejiang Sega					
۹۹/۶/۲۴	۴۰۰ گرم در هکتار	۱۴ روز	سیب زمینی	سفیدک داخلی	زرین خوشه جنوب	WG	۵۲/۵٪	زرین پرو	فاموکسادون ۲۲/۵٪+ سیموکسانیل ۳۰٪	۲۷۳
					Shanghai Shengnong					
۱۴۰۳/۹/۱۹	۴۰۰ گرم در هکتار	۷ روز	هندوانه	لکه برگ آلترناریایی	دلتا پارس نهاده	WG	۵۲/۵٪	اسپیدول (Spidoll)	فاموکسادون ۲۲/۵٪+ سیموکسانیل ۳۰٪	۲۷۴
					Astranova					
۷۵/۱/۲۷	۱ در هکتار	۳۷ روز	گندم	زنگ زرد	کمی نوا	SC	۲٪	ایمپک	فلوتریافول	۲۷۵
۹۹/۴/۹	۲/۵ در هزار	۱۴ روز	انگور	سفیدک پودری	الیت ساوان	EC	۵٪	گاتن	فلوتیانیل	۲۷۶
					OAT AGRO					
۸۳/۱۰/۲۱	۱/۲۵ در هکتار	۵۶ روز	گندم	سپتوریوز	دپونت	SE	۷٪	الرت	فلوزیلازول ۱۲/۵٪+ کاربندازیم ۲۵٪	۲۷۷
۸۱/۴/۱۰	۲ سی سی برای یک ضد عفونی کیلو بذر		برنج	پوسیدگی طوقه	سینجنتا	FS	۲/۵٪	سلست	فلودیوکسانیل	۲۷۸
۱۴۰۱/۵/۱۰	۲۵۰ میلی لیتر به ازای ۱۰۰۰ کیلوگرم غده بذر		سیب زمینی	شانکر رایزوکتونیایی	سینجنتا	FS	۱۰٪	سلست	فلودیوکسانیل	۲۷۹
۹۹/۴/۹	۰/۲۵ در هزار	۱۴ روز	انگور	سفیدک پودری	OAT AGRO	EC	۵٪	گاتن	فلوتیانیل	۲۸۰

۲۸۱	فلوکسایپروکساد	سرکادیس	۳۰٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	هلو	۲۱ روز	۰/۱۵ در هزار	۱۴۰۰/۴/۲۸
۲۸۲	فلوکسایپروکساد	سرکادیس	۳۰٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	انگور	۲۱ روز	۰/۱۵ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱
۲۸۳	فناماکریل	لیانگدی	۲۵٪	SC	کیمیا سبزینه پویا	فوزاریوم	سنبله گندم	-	۳ لیتر در هکتار (در تناوب با قارچ کش های رایج)	۹۷/۱۰/۱۷
					جیانگ سو					
۲۸۴	فوزتیل آلومینیوم	الیت	۸۰٪	WG	شاندونگ داچنگ	گموز	پسته	۳۰ روز	۲/۵ در هزار	۹۲/۱۲/۵
۲۸۵	فوزتیل آلومینیوم	رودر	۸۰٪	WP	دوگال	گموز	مرکبات	۱۴ روز	۲ در هزار	۹۶/۵/۲
۲۸۶	فوزتیل آلومینیوم	فیتوکیور	۸۰٪	WP	گل سم گرگان	انگومک	پسته	۱۴ روز	۲/۵ در هزار	۹۹/۱۰/۲۲
					Limin Chemical					
۲۸۷	فوزتیل آلومینیوم ۶۶/۶۷٪+ فلوپیکولید ۴/۴۵٪	پروفایلر	۷۱/۱٪	WG	بایر آ گ	سفیدک داخلی	انگور	۷ روز	۲-۲/۵ در هزار بسته به شدت بیماری در سه نوبت	۹۵/۸/۲۴
۲۸۸	عصاره اسپند (هارمین)	نانوپگان	۱۳٪	نانوامولسیون	زیست کنترل نانو مقیاس	پوسیدگی فوزاریومی ریشه و ساقه	گوجه فرنگی		۱۵ در هزار	۱۴۰۳/۷/۱۶
۲۸۹	عصاره سیر	آلیسین	۵٪	ME	گیاه پرنیان اطلس	سفیدک پودری	خیار گلخانه ای	-	یک در هزار	۱۴۰۳/۱۲/۱۱
					Chengdu Newsun Crop Science					
۲۹۰	عصاره سیر ، روغن پنبه دانه، روغن ذرت	میلدی کیور	۸۳٪	SL	بازرگان کالا	سفیدک پودری	خیار	-	مزرعه: ۱۰ در هزار	۹۶/۸/۲۹
					Jh biotech				گلخانه: ۷/۵ در هزار	

۲۹۱	کاپتان	ارتوساید	۵۰٪	WP	آریستا	گیاهچه اشجار	اشجار جنگلی و گیاهان مثمر	۱۰ روز	۷/۵-۱۰ گرم در متر مربع تا عمق ۱۰ سانتیمتری خاک	۴۷/۱۰/۱
۲۹۲	کاپتان	ارتوساید	۵۰٪	WP	آریستا	پیچیدگی برگ	هلو	۱۰ روز	۳-۳/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۹۳	کاپتان	ارتوساید	۵۰٪	WP	آریستا	بیماری غربالی	درختان میوه	۱۰ روز	۳ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۹۴	کاپتان	ارتوساید	۵۰٪	WP	آریستا	لکه سیاه	سیب	۱۰ روز	۳ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۹۵	کاپتان	ارتوساید	۵۰٪	WP	آریستا	بوته میری	نخود	۱۰ روز	۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۹۶	کاپتان	ارتوساید	۵۰٪	WP	آریستا	سفیدک داخلی	مو	۱۰ روز	۳ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۹۷	کاربندازیم	باویستین	۵۰٪	WP	بایرساینس کروپ	سیاهک پنهان	گندم		۲/۵ در هزار	۵۳/۲/۲۳
۲۹۸	کاربندازیم	باویستین	۵۰٪	WP	بایرساینس کروپ	سیاهک پنهان	جو		۲/۵ در هزار	۵۳/۲/۲۳
۲۹۹	کاربندازیم	باویستین	۶۰٪	WP	بایرساینس کروپ	سیاهک پنهان	گندم		۲ در هزار	۵۳/۲/۲۳
۳۰۰	کاربندازیم	باویستین	۶۰٪	WP	بایرساینس کروپ	سیاهک پنهان	جو		۳ در هزار	۵۳/۲/۲۳
۳۰۱	کاربوکسین	ویتاواکس	۷۵٪	WP	یونی رویال	سیاهک اشکار	گندم - جو		۲ در هزار	۵۱/۱۱/۱۶
۳۰۲	کاربوکسین	ویتاواکس	۷۵٪	WP	یونی رویال	مرگ گیاهچه	حبوبات		۲ در هزار	۵۱/۱۱/۱۶
۳۰۳	کاربوکسین	ویتاواکس	۷۵٪	WP	یونی رویال	ضد عفونی	حبوبات		۲ در هزار	۵۱/۱۱/۱۶
۳۰۴	کاربوکسین ۲۰٪ + تیرام ۲۰٪	ویتاواکس تیرام	۴۰٪	FS	Krampton	سیاهک اشکار	گندم		۲ در هزار به روش ضد عفونی بذر	۷۵/۴/۱۸
۳۰۵	کاربوکسین ۲۰٪ + تیرام ۲۰٪	ویتاواکس تیرام	۴۰٪	FS	Krampton	سیاهک اشکار	جو		۲ در هزار به روش ضد عفونی بذر	۷۵/۴/۱۸
۳۰۶	کاربوکسین ۲۰٪ + تیرام ۲۰٪	ویتاواکس تیرام	۴۰٪	FS	Krampton	سیاهک پنهان	گندم		۲ در هزار به روش ضد عفونی بذر	۷۵/۴/۱۸
۳۰۷	کاربوکسین ۳۷/۵٪ + تیرام ۳۷/۵٪	ویتاواکس تیرام	۷۵٪	WP	Krampton	پوسیدگی برفی	گندم		۲ در هزار به روش ضد عفونی بذر	۵۲/۴/۶
۳۰۸	کاربوکسین ۳۷/۵٪ + تیرام ۳۷/۵٪	ویتاواکس تیرام	۷۵٪	WP	Krampton	لکه قهوه ای نواری	برنج		۲ در هزار به روش ضد عفونی بذر	۵۲/۴/۶

۳۰۹	کاربوکسین ۳۷/۵٪ + تیرام ۳۷/۵٪	ویتاواکس تیرام	۷۵٪	WP	Krampton	پوسیدگی طوقه و ریشه	برنج		۲ در هزار به روش ضد عفونی بذر	۵۲/۴/۶
۳۱۰	کاربوکسین ۳۷/۵٪ + تیرام ۳۷/۵٪	ویتاواکس تیرام	۷۵٪	WP	Krampton	مرگ گیاهچه	پنبه		۴-۶ در هزار به روش ضد عفونی بذر	۵۲/۴/۶
۳۱۱	کاربوکسین ۳۷/۵٪ + تیرام ۳۷/۵٪	ویتاواکس تیرام	۷۵٪	WP	Krampton	مرگ گیاهچه	چغندر		۲-۲/۵ در هزار به روش ضد عفونی بذر	۵۲/۴/۶
۳۱۲	کاربوکسین ۳۷/۵٪ + تیرام ۳۷/۵٪	ویتاواکس تیرام	۷۵٪	WP	Krampton	سیاهک پنهان و طویل	ذرت		۲ در هزار به روش ضد عفونی بذر	۵۲/۴/۶
۳۱۳	کاربوکسین ۳۷/۵٪ + تیرام ۳۷/۵٪	ویتاواکس تیرام	۷۵٪	WP	Krampton	سیاهک خوشه ای	ذرت		۲/۵ در هزار به روش ضد عفونی بذر	۵۲/۴/۶
۳۱۴	کاربوکسین ۳۷/۵٪ + تیرام ۳۷/۵٪	ویتاواکس تیرام	۷۵٪	WP	Krampton	لکه قهوه ای نواری	جو		۲/۵ در هزار به روش ضد عفونی بذر	۷۵/۴/۱۸
۳۱۵	کارپروپامید	وین	۳۰٪	SC	بایر کروب ساینس	بلاست	برنج		۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	۸۱/۱۱/۷
۳۱۶	کروزکسیم متیل	استروبی	۵۰٪	WG	ب آ اس اف	سفیدک پودری	کدوئیان	۴ روز	۰/۲ در هزار	۸۷/۵/۲
۳۱۷	کروزکسیم متیل	استروبی	۵۰٪	WG	ب آ اس اف	سفیدک پودری	سیب		۰/۱۶-۰/۲ در هزار	۸۲/۴/۹
۳۱۸	کروزکسیم متیل	استروبی	۵۰٪	WG	ب آ اس اف	لکه سیاه	سیب		۰/۲ در هزار	۸۳/۸/۱۱
۳۱۹	کروزکسیم متیل	استروبی	۱۵۰٪	WG	ب آ اس اف	سفیدک پودری	انگور	۱۴ روز	۰/۲ در هزار	۱۴۰۴/۵/۱۳
۳۲۰	کوپراکسی کلراید	کوپراویت	۳۵٪	WP	بایر کروب ساینس	مومیایی پیچیدگی برگ	هلو - درختان میوه سردسیری		۳ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۲۱	کوپراکسی کلراید	کوپراویت	۳۵٪	WP	بایر کروب ساینس	پوسیدگی گل اذین	نخیلات		۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۲۲	کوپراکسی کلراید	کوپراویت	۳۵٪	WP	بایر کروب ساینس	سفیدک دروغی	گوجه فرنگی		۳ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۲۳	کوپراکسی کلراید	کوپراویت	۳۵٪	WP	بایر کروب ساینس	سفیدک دروغی	سیب زمینی		۳ در هزار	۴۷/۱۰/۱

۳۲۴	کوپراکسی کلراید	کوپراویت	۳۵٪	WP	بایر کروپ ساینس	سفیدک داخلی	سبزی و جالیز		۱-۲ لیتر در هکتار٪	۴۷/۱۰/۱
۳۲۵	کوپراکسی کلراید	کوپراویت	۳۵٪	WP	بایر کروپ ساینس	گموز	مرکبات		دوغاب ۱٪	۴۷/۱۰/۱
۳۲۶	کوپراکسی کلرید	کوپر پلاس	۵۰٪	WP	آرمان سبز آدینه	سفیدک داخلی	گوجه فرنگی	۳ روز	۲ در هزار	۱۴۰۰/۴/۱۴
					شیام کمیکالز					
۳۲۷	کینوسول	بلتانول	۳۷/۵٪	SL	سبا کوشا کشت	بوته میری <i>Phytophthora melonis</i>	خیار (گلخانه و فضای باز)	ندارد	۵/۰ در هزار (نوبت اول بلافاصله پس از کاشت و نوبت دوم بین مرحله ۲-۳ برگی همراه با آب آبیاری)	۹۸/۴/۱۰
					پروبلت فیتو اسپانیا					
۳۲۸	ناتامایسین	سرافروتا	۱۳.۴۶٪	SC	فناوری زیستی طبیعت گرا	کپک سبز	پرتقال		۵/۹ در هزار (غوطه ور سازی میوه پرتقال به مدت یک دقیقه در محلول بلافاصله پس از برداشت و قبل از انتقال به بازار یا سردخانه)	۱۴۰۵/۵/۲۶
					Ceradis Crop Protection					
۳۲۹	مندی پروپامید ۲۵٪+ دیفنوکونازول ۲۵٪	کاریال استار	۵۰٪	SC	سینجنتا	سفیدک داخلی	خیار(گلخانه)	۱ روز	۷/۰ در هزار (استفاده بیش از دو نوبت متوالی و بیش از ۴ نوبت در یک دوره تولید ممنوع است.	۹۷/۱۰/۱۷
۳۳۰	مندی پروپامید ۲۵٪+ دیفنوکونازول ۲۵٪	کاریال استار	۵۰٪	SC	سینجنتا	لکه موجی- سفیدک داخلی	گوجه فرنگی	۳ روز	۷۰۰ میلی لیتر در هکتار در مناطق مرطوب کناره های دریای خزر و سواحل خلیج	۱۴۰۲/۳/۲۹

۳۳۱	مانکوزب	دیتان ام ۴۵	۸۰٪	WP	داو اگرو ساینس	سیاهک پنهان	گندم	۱۰ روز	۲ در هزار به طریق ضد عفونی بذر	۴۷/۱۰/۱
۳۳۲	مانکوزب	دیتان ام ۴۵	۸۰٪	WP	داو اگرو ساینس	لکه اجری	بادام	۱۰ روز	۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۳۳	مانکوزب	دیتان ام ۴۵	۸۰٪	WP	داو اگرو ساینس	سفیدک داخلی	یونجه	۱۰ روز	۲ کیلوگرم در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۳۳۴	مانکوزب	دیتان ام ۴۵	۸۰٪	WP	داو اگرو ساینس	برق زدگی	نخود	۱۰ روز	۲ کیلوگرم در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۳۳۵	مانکوزب	دیتان ام ۴۵	۸۰٪	WP	داو اگرو ساینس	سفیدک داخلی	توتون	۱۰ روز	۱-۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۳۶	مانکوزب	دیتان ام ۴۵	۸۰٪	WP	داو اگرو ساینس	زنگ	میخک	۱۰ روز	۲-۱/۵ در هزار همراه با مویان ۰/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۳۷	مایکلوبوتانیل	آتیس	۴۰٪	WP	سبزمحصول داتیس ناگارجونا اگری کم	لکه سیاه	سیب درختی	۵ روز	۰/۳ در هزار (به صورت تناوبی با قارچ-کش-های دیگر)	۹۷/۹/۲۶
۳۳۸	متا بی سولفیت سدیم	سولفور پد	۷ گرم متا بی سولفیت	پد کاغذی	اروم زرین خوشه	بیماریهای قارچی	انگور	-	یک بسته ۷ گرمی برای نگهداری ۵ کیلوگرم انگور	۸۶/۸/۲۸
۳۳۹	متالاکسیل	ریدومکس	۵٪	GR	اکسیر کشاورزی یزد منبع تکنیکال Zhejiang Heben	بوته میری <i>Pythium aphanidermatum</i>	خيار گلخانه ای	۷ روز	۲ گرم در متر مربع (گلخانه) در سطح محدود به صورت گرانول پاشی (۱۴۰۰/۱۱/۲۵)	۹۹/۹/۱۷
					گیاه					

۳۴۰	متالاکسیل	ردوکسیل	۵٪	GR	منبع تکنیکال Zhejiang Heben	بوته میری Pythium aphanidermatu m	خيار گلخانه ای	۷ روز	۲ گرم در متر مربع (گلخانه) در سطح محدود به صورت گرانول پاشی (۱۴۰۰/۱۱/۲۵)	۹۹/۹/۱۷
۳۴۱	متالاکسیل	ریدومیل	۵٪	GR	سینجنتا	بوته میری	خيار	۷ روز	۲۵-۲۰ کیلو گرم در هکتار	۷۰/۱۱/۲۱
۳۴۲	متالاکسیل ام (مفنوکسام) ۱۰ گرم/لیتر+فلودیوکسانیل ۲۵ گرم/لیتر	ماکسیم ایکس ال	۳/۵٪	FS	سینجنتا	فوزاریوم	ذرت		۱ در هزار (به روش ضد عفونی بذر)	۱۴۰۰/۶/۱
۳۴۳	متالاکسیل ام ۱۰ گرم/لیتر+فلودیوکسانیل ۲۵ گرم/لیتر	ماکسیم ایکس ال	۳/۵٪	FS	سینجنتا	پیتیوم	ذرت دانه ای		۱۰۰ میلی لیتر در ۱۰۰ کیلوگرم بذر (به روش ضد عفونی بذر)	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۳۴۴	متالاکسیل ام (مفنوکسام) ۱۰ گرم/لیتر+فلودیوکسانیل ۲۵ گرم/لیتر	ماکسیم ایکس ال	۳/۵٪	FS	سینجنتا	بوته میری پیتیومی	گوجه فرنگی		۱ میلی لیتر در هر کیلوگرم بذر (به روش ضد عفونی بذر)	۱۴۰۳/۱۰/۲۴
۳۴۵	متالاکسیل ام (مفنوکسام) ۱۰ گرم/لیتر+فلودیوکسانیل ۲۵ گرم/لیتر	ماکسیم ایکس ال	۳/۵٪	FS	سینجنتا	مرگ گیاهچه	چغندر قند		۳ در هزار (ضد عفونی بذور)	۱۴۰۴/۳/۵
۳۴۶	متالاکسیل ام (مفنوکسام) ۱۰ گرم/لیتر+فلودیوکسانیل ۲۵ گرم/لیتر	ماکسیم ایکس ال اف اس ۰۳۵	۳/۵٪	FS	سینجنتا	ساق سیاه و سفیدک داخلی	کلزا		۲۸ سی سی در ۱۰۰ سی سی آب برای ضد عفونی ۱۰ کیلو بذر قبل از کاشت	۱۴۰۵/۳/۱۸
					گیاه پرنیان اطلس				۳/۵ لیتر در هکتار در مناطق با آلودگی زیاد	

۳۴۷	مِتالا دسیل ام ۱۰ گرم/لیتر+فلودیوکسانیل ۲۵ گرم/لیتر	مالوین ایحس ال اف اس ۰۳۵	۳/۵%	SC	Safa Tarim	پوسیدگی فوزاریومی ریشه	پیاز	۱۴ روز	۲/۵ لیتر در هکتار در مناطق با آلودگی کم	۱۴۰۱/۹/۱
۳۴۸	مِتالاکسیل ام (مفنوکسام) ۱۰ گرم/لیتر+فلودیوکسانیل ۲۵ گرم/لیتر	هاکی ایکس ال(Hockey) (XL ۰۳۵ FS)		Fluid Concentrate for Seed Treatment	رویال ساکار تجارت دوگال	بوته میری پیتیومی و پوسیدگی فوزاریومی ریشه	گوجه فرنگی	۱۴ روز	۲/۵ میلی لیتر در کیلوگرم بذر برای ضد عفونی ۲/۵ در هزار (محلول پاشی) در سه مرحله:یک بار به سینی نشا در زمان انتقال نشا(۳ لیتر در هر متر مربع سینی کشت) و دو بار پس از انتقال به مزرعه به فاصله یک هفته همراه آب آبیاری (۵۰ میلی لیتر برای هر بوته)	۱۴۰۳/۱۰/۲۴
۳۴۹	مِتالاکسیل ام (مفنوکسام) ۱۲/۴٪+ آزوکسی استروبین ۳۲/۲٪	یونیفورم	۴۴/۶٪	SE	سینجنتا	بوته میری	خیار(گلخانه و فضای باز)	۲ روز	۱/۵ لیتر در هزار	۹۸/۴/۱۰
۳۵۰	مِتالاکسیل ۳/۵٪ + هیدروکسید مس ۱۸/۵٪	آر متیل آر	۲۲٪	SC	پیراکشت شیمی Industrias Quimicas Valles	سفیدک داخلی	گوجه فرنگی	۲۱ روز	۲/۵ در هزار	۹۹/۴/۹
۳۵۱	مفن تری فلوکونازول	رویونا	۷/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	انگور	۲۱ روز	یک در هزار	۱۴۰۲/۵/۳۰
۳۵۲	نمک های مونو و دی پتاسیم اسید فسفونیک	فسفایت	۵۳٪	SL	JI Biotech	سفیدک داخلی	خیار- گلخانه	ندارد	۴-۳ در هزار	۹۵/۶/۲۹
۳۵۳	نمک های مونو و دی پتاسیم اسید	اگر نفوس	۶۰٪	SL	بصیر شیمی	پوسیدگی فایتوفتراه , ریشه	یسته	ندارد	۲/۵ در هزار	۱۴۰۰/۹/۲۹

	فسفونیک	تولالین	۵٪	SC	شرکت کیمیا سبزاور	سفیدک داخلی <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	خیار گلخانه			
۳۵۴	نمک های مونو و دی پتاسیم اسید فسفونیک	اگریفوس	۴۰٪	SL	اگری کم	سفیدک داخلی	سیب زمینی	ندارد	۶ لیتر در هکتار	۸۳/۱۰/۲۱
۳۵۵	های مکسازول	تاچی گارن	۳۰٪	SL	Mitsui	پژمردگی فوزاریمی	گوچه فرنگی	۱۰ روز	قبل از انتقال نشاء یک در هزار، یک هفته بعد از انتقال نشاء دو در هزار و دو هفته پس از سمپاشی دوم به مقدار ۲ در هزار	۹۵/۱۰/۲۷
۳۵۶	هگزاکونازول	انویل	۵٪	SC	سینجنتا	سفیدک پودری	انگور	۱۴ روز	۰/۲۵ در هزار	۷۹/۱۲/۱۵
۳۵۷	هیدروکسید مس ۱۴٪+اکسی کلرور مس ۱۴٪	BADGE	۲۸٪	WG	بازارگان کالا ISAGRO	پیچیدگی برگ	هلو	۷ روز	۱/۲ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱۵
۳۵۸	هیدروکسید مس ۱۴٪+اکسی کلرور مس ۱۴٪	BADGE	۲۸٪	WG	بازارگان کالا ISAGRO	سفیدک کرکی	گوچه فرنگی	۳ روز	۲/۵ کیلوگرم در هکتار	۱۴۰۱/۵/۱۰
۳۵۹	هیدروکسید مس ۲ Cu(OH)	توبالین Tobalin	۵٪	SC		سفیدک داخلی			۵ در هزار	۱۴۰۴/۳/۵