

قارچ کش های تصویب شده تا دی ماه ۱۴۰۴

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	بیماری	محصول	کارنسی	دز مصرف	تاریخ ثبت
۱	آزوکسی استروبین ۲۰۰ گرم/لیتر + دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/لیتر	ارتیواتاپ	۳۲/۵٪	SC	سینجنتا	سفیدک پودری	جالیز - مزرعه. گلخانه	خیار: ۲ روز	مزرعه: ۱ لیتر در هکتار	۸۸/۹/۳۰
								گوجه فرنگی: ۲ روز	گلخانه: ۰/۷۵ در هزار	
۲	آزوکسی استروبین ۲۰۰ گرم/لیتر + دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/لیتر	ارتیواتاپ	۳۲/۵٪	SC	سینجنتا	لکه برگی سرکوسپورایی	چغندر قند	-	۱ لیتر در هکتار	۹۹/۱۰/۲۲
۳	آزوکسی استروبین ۲۰۰ گرم/لیتر + دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/لیتر	ارتیواتاپ	۳۲/۵٪	SC	سینجنتا	لکه موجی	گوجه فرنگی	۳ روز	۱۳۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۴	آزوکسی استروبین ۲۰۰ گرم/لیتر + دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/لیتر	سفیر	۳۲/۵٪	SC	بارزگانان سرای سهند	سفیدک پودری	خیار گلخانه	۲ روز	۰/۷۵ در هزار حداکثر دو بار سمپاشی	۹۷/۷/۱۶
۵	آزوکسی استروبین ۲۰۰ گرم/لیتر + دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/لیتر	دیفوربین	۳۲/۵٪	SC	کاوش کیمیای کرمان	سفیدک پودری	خیار گلخانه	۲ روز	۰/۷۵ در هزار حداکثر دو بار سمپاشی	۹۷/۷/۱۶
۶	آزوکسی استروبین ۱۲۵g/l + دیفنوکونازول ۱۲۵ g/l	بیکانتا	۲۵٪	SC	سینجنتا	سپتوریای برگ	گندم	-	یک لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۱۱/۳
۷	آزوکسی استروبین ۲۰۰ گرم/لیتر + سیپروکونازول ۸۰ گرم/لیتر	آمیستاراکسترا	۲۸٪	SC	سینجنتا	زنگ زرد	گندم	۳۵ روز	۰/۷۵ لیتر در هکتار	۹۲/۸/۲۷
۸	آزوکسی استروبین ۲۰٪ + سیازوفامید ۱۰٪	سیازوبین	۳۰٪	SC	پاک سم ایرانیان	سفیدک داخلی	خیار	۳ روز	۱/۲ میلی لیتر در هزار	۱۴۰۳/۹/۵
					Tianjin Highpoint Plant Protection					
۹	اپوکسی کونازول	اپوس (opus)	۱۲/۵٪	SC	BASF	سفیدک پودری	چغندر قند	۲۸ روز	۱ لیتر در هکتار	۸۲/۲/۱

۹۲/۳/۲۷	۰/۵ لیتر در هکتار	۴۲ روز	گندم	بیماری فوزاریمی سنبله	ب آ اس اف	SC	۴۹/۷٪	رکس دو	اپوکسی کونازول ۱۸۷ گرم /لیتر+تیوفانات متیل ۳۱۰ گرم/لیتر	۱۰
۹۷/۶/۲۷	۰/۵ لیتر در هکتار	۴۲ روز	گندم	زنگ زرد	ب آ اس اف	SC	۴۹/۷٪	رکس دو	اپوکسی کونازول ۱۸۷ گرم /لیتر+تیوفانات متیل ۳۱۰ گرم/لیتر	۱۱
۹۷/۷/۱۶	۰/۵ لیتر در هکتار	۴۳ روز	چغندر قند	سفیدک پودری	ب آ اس اف	SC	۴۹/۷٪	رکس دو	اپوکسی کونازول ۱۸۷ گرم /لیتر+تیوفانات متیل ۳۱۰ گرم/لیتر	۱۲
۹۸/۱۰/۹	۴ در هزار	ندارد	توت فرنگی	کپک خاکستری	روماک گستر غرب	EC	۶۰٪	روماک	اسانس روغن بنه	۱۳
۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۰/۲ در هزار در مرحله جوانه زنی شاخه ها و با فاصله ۱۴ روز از سمپاشی	۱۴ روز	انگور	سفیدک پودری	بایر آگ	CS	۳۰٪	پروسپر	اسپروکسامین	۱۴
۱۴۰۳/۵/۱	دو در هزار	-	گندم	سیاهک پنهان (خد عفونی بذور)	پاک گستر پرند	SL	۲۰٪	فورمایسین گلد پی ایکس	اسید پراستیک +پراکسید هیدروژن	۱۵
۱۴۰۳/۶/۲۶	۴ در هزار	-	لیموترش	جاروک	جاوید شیمی فارس	L	۰.۱۳	آزینو	اسیدهای آمینه	۱۶
۹۹/۱۱/۶	۲ در هزار	۲۱ روز	گردو	آنتراکنوز	رها اندیش کالک	WG	۴۵٪	ردشیلد	اکسید مس	۱۷
۱۴۰۱/۵/۱۰	۲ در هزار	۱۵ روز	درختان میوه هسته دار	شانکر باکتریایی <i>Pseudomonas syringae</i>	رها اندیش کاوان Nordox	WG	۴۵٪	رد شیلد	اکسید مس	۱۸
۹۱/۶/۲۰	۱ در هزار	۱۵ روز	درختان میوه دانه دار	آتشک	نوردوکس آ.اس نروژ	WG	۷۵٪	نوردوکس	اکسید مس	۱۹

۲۰	اکسید مس	نوردوکس	۷۵٪	WG	نوردوکس آ.آس نروژ	پیچیدگی برگ	هلو	۱۵ روز	۲/۵ در هزار	۹۰/۴/۱۳
۲۱	اکسید مس	نوردوکس	۷۵٪	WG	نوردوکس آ.آس نروژ	سفیدک داخلی	سیب زمینی	۱۵ روز	۱ کیلوگرم در هکتار	۹۴/۷/۶
۲۲	اکسید مس	نوردوکس	۷۵٪	WG	نوردوکس آ.آس نروژ	پوسیدگی طوقه و ریشه	برنج	-	۱۳۰ گرم برای یکصد کیلوگرم بذر	۹۶/۴/۱۹
۲۳	اکسید مس (نوردوکس) ۲۵/۸٪+متالاکسیل ۶٪	نوردوکسیل	۳۱/۸٪	SC	پیرا کشت	سفیدک داخلی	توتون	-	۱/۵ لیتر در هکتار (خزانة)	۱۴۰۰/۹/۲۹
					Zhejiang Heben				۲ لیتر در هکتار (مزرعه)	
۲۴	اکسی کلور مس (دارای ۲۹/۷۵٪ یون مس)	کوپر پلاس	۵۰٪	WP	ارمان سبز	سفیدک داخلی	گوجه فرنگی	۳ روز	۲ در هزار	۱۴۰۰/۴/۱۴
					آدینه شیام کمیکالز					
۲۵	اکسی کلور مس (دارای ۲۹/۷۵٪ یون مس)	فلیت	۵۰٪	WP	بصیر شیمی	گموز فایتوثرایی	مرکبات	-	۱۰۰ گرم در لیتر	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
					پارس	طوقه				
۲۶	اکسی کلور مس (دارای ۳۵٪ یون مس)	اکسی کلور پرتونار	۵۸/۸٪	SC	پرتونار	سفیدک داخلی	خیار	۳ روز	۳/۵ در هزار	۱۴۰۰/۶/۱
					ویمال هند					
۲۷	اکسی کلور مس (دارای ۵۸/۳٪ یون مس)	کوپراکسی کلرید برزگر	۸۵٪	WP	برزگر برجسته	پیچیدگی برگ	هلو	-	۴ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱۵
					Agro life Science corporati					
۲۸	اکسی کلور مس (دارای ۳۵٪ یون مس)	کوپراویت	۵۸/۸٪	WP	بایر کروپ ساینس	مومیایی پیچیدگی برگ	درختان میوه سردسیری	۱۴ روز	۳ کیلوگرم در ۱۰۰۰ آب	۴۷/۱۰/۱
۲۹	اکسی کلور مس (دارای ۳۵٪ یون مس)	کوپراویت	۵۸/۸٪	WP	بایر کروپ ساینس	پیچیدگی برگ	هلو	۱۴ روز	۳ کیلوگرم در ۱۰۰۰ آب	۴۷/۱۰/۱
۳۰	اکسی کلور مس (دارای ۳۵٪ یون مس)	کوپراویت	۵۸/۸٪	WP	بایر کروپ ساینس	پوسیدگی گل اذین	نخیلات	-	۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ آب	۴۷/۱۰/۱

۳۱	اکسی کلرور مس (دارای ۳۵٪ یون مس)	کوپراویت	۵۸/۸٪	WP	بایر کروپ ساینس	سفیدک داخلی	گوجه فرنگی	۳ روز	۳ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۲	اکسی کلرور مس (دارای ۳۵٪ یون مس)	کوپراویت	۵۸/۸٪	WP	بایر کروپ ساینس	سفیدک داخلی	سیب زمینی	-	۳ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۳	اکسی کلرور مس (دارای ۳۵٪ یون مس)	کوپراویت	۵۸/۸٪	WP	بایر کروپ ساینس	سفیدک داخلی	سبزی و جالبیز	۳ روز	۲-۱ کیلوگرم در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۳۴	اکسی کلرور مس (دارای ۳۵٪ یون مس)	کوپراویت	۵۸/۸٪	WP	بایر کروپ ساینس	گموز	مرکبات	-	دوغاب ۱٪	۴۷/۱۰/۱
۳۵	اکسی کلرور مس (دارای ۳۵٪ یون مس)	کیمیا کوپر اکسی	۵۸/۸٪	SC	کاوش کیمیای کرمان	سفیدک داخلی	خیار	۳ روز	۳/۵ در هزار	۱۴۰۰/۶/۱
۳۶	اکسی کلرور مس ۳۹/۷۵٪+	کوپروسیت سی	۴۳/۹۵٪	WP	دلتا پارس نهاده	سفیدک داخلی	خیار	۵ روز	۳ کیلو گرم در هکتار	۹۴/۶/۲۳
	سیموکسانیل ۴/۲٪				اگر یا					
۳۷	اکسی کلرور مس ۱۴/۱۹٪ + مفنوکسام (متلاکسیل ام) ۲٪	ریدومیل گلد آر	۱۶/۱۹٪	WG	سینجنتا	سفیدک داخلی	خیار	۳ روز	گلخانه: ۶ در هزار	۱۴۰۰/۹/۲۹
									فضایی باز: ۶ کیلوگرم در هکتار (دوبار سمپاشی در فصل زراعی به فاصله ۱۴ روز)	
۳۸	اکسی کلرور مس ۱۴٪ + هیدروکسید مس ۱۴٪	BADGE	۲۸٪	WG	بازارگان کالا	پیچیدگی برگ	هلو	۷ روز	۱/۲ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱۵
					ISAGRO					
۳۹	اکسی کلرور مس ۱۴٪ + هیدروکسید مس ۱۴٪	BADGE	۲۸٪	WG	بازارگان کالا	سفیدک داخلی	گوجه فرنگی	سه روز	۲/۵ کیلوگرم در هکتار	۱۴۰۱/۵/۱۰
					ISAGRO					

۴۰	امتوکترا دین ۳۰٪ + دیمتومورف ۲۲/۵٪	اوروگو	۵۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک داخلی	خیار (فضای باز و گلخانه)	۱ روز	۰/۷ در هزار استفاده بیش از دو نوبت متوالی و بیش از چهار نوبت در یک دوره تولید ممنوع است.	۹۷/۱۰/۱۷
۴۱	امتوکترا دین ۳۰٪ + دیمتومورف ۲۲/۵٪	اوروگو	۵۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک داخلی	هندوانه	۱ روز	۰/۷ در هزار در فواصل زمانی ۷-۱۰ روز جهت کنترل بیماری	۹۹/۲/۸
۴۲	امتوکترا دین ۳۰٪ + دیمتومورف ۲۲/۵٪	اوروگو	۵۳/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک داخلی	انگور	۱ روز	۱ در هزار، در فواصل زمانی ۷-۱۰ روز جهت کنترل بیماری	۹۹/۴/۳۰
۴۳	ایپرودیون	رورال	۵۰٪	WP	بایر آگ	شانکر ریزو کتونیایی ساقه و	سیب زمینی	-	۲٪ وزن غده	۸۶/۱۰/۱۰
۴۴	ایپرودیون ۳۵٪ + کاربندازیم ۱۷/۵٪	رورال تی اس	۵۲/۵٪	WP	بایر آگ	شیت بلاست	برنج	-	۱ کیلوگرم در هکتار	۶۴/۷/۲۲
۴۵	ایپرودیون ۳۵٪ + کاربندازیم ۱۷/۵٪	رورال تی اس	۵۲/۵٪	WP	بایر آگ	لکه قهوه ای نواری	جو	-	۱ در هزار به روش ضد عفونی بذر	۷۵/۱۲/۶
۴۶	ایپرودیون ۳۵٪ + کاربندازیم ۱۷/۵٪	رورال تی اس	۵۲/۵٪	WP	بایر آگ	خشکیدگی سر شاخه	توت	-	۱ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب	۶۴/۷/۲۲
۴۷	ایپرودیون ۳۵٪ + کاربندازیم ۱۷/۵٪	رورال تی اس	۵۲/۵٪	WP	بایر آگ	حفظ و نگهداری (انبارداری)	مرکبات	-	۱ در هزار	۸۰/۳/۲۱
۴۸	ایپرودیون ۱۷/۵٪ + کاربندازیم ۸/۵٪	رست آپ	۲۶٪	SC	پاک سم ایرانیان Jiangsu Lanfeng	شانکر ریزو کتونیایی ساقه و شوره سیاه غده	سیب زمینی	-	۴ لیتر به ازای ۱۰۰۰ کیلوگرم غده بذری	۹۹/۴/۳۰
۴۹	ایزوپروتیولان	فوجی وان	۴۰٪	EC	نیمون نوهیاکو	بلاست	برنج	۱۴ روز	۱/۲۵ لیتر در هکتار	۹۶/۳/۱

۵۰	ایمازالیل	فونگافلور	۵٪	SL	داو آگرو ساینس	لکه قهوه ای نواری	جو	-	۱ در هزار	۷۵/۲/۶
۵۱	ایمازالیل ۰/۲٪+تیابندازول ۰/۵٪	سیترازول آ	۰/۷٪	وکس آماده	-	حفظ و نگهداری (انبارداری)	مرکبات		واکس آماده مصرف (اندود کردن میوه با اسفنج)	۸۰/۳/۲۱
۵۲	ایمینو کتادین تریس	بلکیوت	۴۰٪	WP	نیپون سودا	سفیدک پودری	خیار	۱ روز	۰/۷۵-۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۹۲/۴/۱۷
۵۳	ایمینو کتادین تریس	بلکیوت	۴۰٪	WP	نیپون سودا	لکه موجی (آلترناریا)	سیب زمینی	۷ روز	۷۵۰ گرم در هکتار	۹۳/۳/۱۲
۵۴	ایمینو کتادین تریس	بلکیوت	۴۰٪	WP	نیپون سودا	سفیدک پودری	انگور	۷ روز	۰/۷۵ در هزار	۹۵/۸/۲۴
۵۵	باسیلوس سوبتیلیس <i>Bacillus subtilis</i>	کانگ می	۵٪	WP	گیاه پرنیان اطلس	بلاست	برنج	۲ روز	۱۸۰ گرم در هکتار به محض مشاهده علائم بیماری یک بار محلول پاشی	۹۷/۲/۲۴
					Deqiang Biology					
۵۶	باسیلوس سوبتیلیس <i>Bacillus subtilis</i>	کانگ می	۵٪	WP	گیاه پرنیان اطلس	لکه موجی (آلترناریا)	گوجه فرنگی	-	۱/۲۵ در هزار در مراحل اولیه رشد گیاه و مراحل اولیه بیماری	۱۴۰۱/۴/۲۰
					Deqiang Biology					
۵۷	باسیلوس سوبتیلیس <i>Bacillus subtilis</i>	سرناد	۱۰ ^{۱۲}	SC	بایرآلمان	کپک خاکستری	توت فرنگی گلخانه	ندارد	۵ در هزار	۹۸/۱۰/۹
۵۸	باسیلوس سوبتیلیس <i>Bacillus subtilis</i>	سرناد	۱۰ ^{۱۲}	SC	بایرآلمان	پژمردگی فوزاریومی	گوجه فرنگی گلخانه	ندارد	۱۰ لیتر در هکتار به روش خیساندن خاک پس از انتقال نشاء	۱۴۰۰/۹/۲۲
۵۹	باسیلوس سوبتیلیس <i>Bacillus subtilis</i>	رویین ۱	۱۰ ^۷	پودر مرطوب	زیست فناوری سبز	پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه	چغندر قند	ندارد	۲۰۰ گرم در هکتار، ۴۵ و ۹۰ روز پس از کاشت	۹۹/۴/۳۰

۶۰	باسیلوس ولزنسیس	پارس باسیل	۱۰ ^۸	SC	رویان تيسان	پژمردگی فوزاریوی	گوچه فرنگی گلخانه	ندارد	در سه مرحله به ترتیب با دزهای ۵،۵ و ۴ لیتر در هکتار	۹۸/۸/۲۷
۶۱	باسیلوس ولزنسیس	پارس باسیل	۱۰ ^۸	SC	رویان تيسان	بلاست برگ	برنج		۴ در هزار بعد بعد از ظهور اولین لکه های بیماری در	۱۴۰۴/۳/۵
۶۲	بردو (مخلوط بردو) (۴/۵۸٪ یون مس)	میشو بردوکس	۱۸٪	SC	سبزآور پردیس	بیماری غربالی	زردآلو	۷ روز	۱۰ در هزار دو مرحله	۹۳/۱۲/۴
۶۳	بردو (مخلوط بردو) (۴/۵۸٪ یون مس)	بردو کیمیا	۱۸٪	SC	کاوش کیمیا کرمان	شانکر سیتوسپرای	سیب	۷ روز	۲ درصد محلول پاشی توأم با پانسمان شانکر با بردو کیمیا ۸ درصد	۹۴/۱۰/۷
۶۴	بردو (مخلوط بردو) (۴/۵۸٪ یون مس)	بردو بهسم	۱۸٪	SC	البرز بهسم	بیماری غربالی	زردآلو	۷ روز	۱۰ در هزار	۹۶/۱۱/۱۶
۶۵	بردو (مخلوط بردو) (۴/۵۸٪ یون مس)	بردوسیف	۱۸٪	SC	سبزآور نگیں فلات	آتشک	درختان میوه دانه دار	۷ روز	۸ در هزار در مرحله جوانه و ۵ در هزار در مرحله ۵ درصد، ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد گل	۹۶/۲/۲۵
۶۶	بردو (مخلوط بردو) (۴/۵۸٪ یون مس)	بردوسیف	۱۸٪	SC	سبزآور نگیں فلات	سفیدک داخلی	خیار(گلخانه)	۷ روز	۵ در هزار	۹۷/۹/۲۶
۶۷	بردو (مخلوط بردو) (۴/۵۸٪ یون مس)	بردوسیف	۱۸٪	SC	سبزآور نگیں فلات	پیچیدگی برگ	هلو	۷ روز	۸ در هزار	۹۸/۳/۲۷
۶۸	بردو (مخلوط بردو) (۵٪ یون مس)	بردو سمیران	۲۰٪	SC	سمیران	پیچیدگی برگ	هلو	۷ روز	۵-۸ در هزار در زمان ریزش برگ در پاییز و تورم جوانه در بهار	۹۶/۳/۱
۶۹	بردو (مخلوط بردو) (۵٪ یون مس)	بردوکسین	۲۰٪	SC	اکسین شیمی آدان	سفیدک داخلی	خیار(گلخانه)	۷ روز	۵ در هزار	۹۷/۹/۲۶
۷۰	بردو (مخلوط بردو) (۵٪ یون مس)	بردوتکس	۲۰٪	SC	پرتونار	سفیدک داخلی	خیار(گلخانه)	۷ روز	۵ در هزار	۹۷/۹/۲۶
۷۱	بردو (مخلوط بردو) (۵٪ یون مس)	بردوتکس	۲۰٪	SC	پرتونار	پیچیدگی برگ	هلو	۷ روز	۹ در هزار	۹۸/۳/۲۷

۹۷/۳/۲۸	۵ در هزار	۷ روز	گوجه فرنگی	سفیدک داخلی	باغبان تاک	SC	۱۸٪	بردوفیکس	بردو (مخلوط بردو) (۴/۵۸٪ یون مس)	۷۲
۹۷/۸/۱۴	۱۰ در هزار در مرحله جوانه و ۴ در هزار در مرحله ۵، ۵۰ و ۱۰۰ درصد گل	۷ روز	دانه دار	آتشک درختان میوه	باغبان تاک	SC	۱۸٪	بردوفیکس	بردو (مخلوط بردو) (۴/۵۸٪ یون مس)	۷۳
۹۸/۳/۲۷	۱۰ در هزار	-	هلو	پیچیدگی برگ	باغبان تاک	SC	۱۸٪	بردوفیکس	بردو (مخلوط بردو) (۴/۵۸٪ یون مس)	۷۴
۹۷/۹/۲۶	۵ در هزار	۷ روز	خیار (گلخانه)	سفیدک داخلی	باغبان تاک	SC	۱۸٪	بردوفیکس	بردو (مخلوط بردو) (۴/۵۸٪ یون مس)	۷۵
۸۴/۶/۱۴	۱۰-۱۵ در هزار	۷ روز	زرد الو	بیماری غربالی	باغبان تاک	SC	۱۸٪	بردو فیکس	بردو (مخلوط بردو) (۴/۵۸٪ یون مس)	۷۶
۹۷/۱۲/۱۳	۹ در هزار	۷ روز	زردالو	بیماری غربالی	گیاه	SC	۲۰٪	بردوجی	بردو (مخلوط بردو) (۵٪ یون مس)	۷۷
۴۷/۱۰/۱	۱ کیلو گرم سولفات مس ۵ آبه ۱/۲۵+ کیلو گرم هیدروکسید کلسیم در ۱۰۰ لیتر آب برای سمپاشی با HV	۷ روز	درختان میوه سرد سیری	شانکر	-	SC	۲۰٪	بردو فیکس	بردو (مخلوط بردو)	۷۸
۴۷/۱۰/۱	۱ کیلو گرم سولفات مس ۵ آبه ۱/۲۵+ کیلو گرم هیدروکسید کلسیم در ۱۰۰ لیتر آب برای سمپاشی با HV	۷ روز	درختان میوه	بیماری غربالی	-	SC	۲۰٪	بردو فیکس	بردو (مخلوط بردو)	۷۹
۴۷/۱۰/۱	۱ کیلو گرم سولفات مس ۵ آبه ۱/۲۵+ کیلو گرم هیدروکسید کلسیم در ۱۰۰ لیتر آب برای سمپاشی با HV	۷ روز	هلو	پیچیدگی برگ	-	SC	۲۰٪	بردو فیکس	بردو (مخلوط بردو)	۸۰
۴۷/۱۰/۱	۴ کیلو گرم سولفات مس ۵ آبه ۲+ کیلو گرم هیدروکسید کلسیم در ۱۰۰ لیتر آب برای سمپاشی با LV	۷ روز	درختان میوه سرد سیری	شانکر	-	SC	۲۰٪	بردو فیکس	بردو (مخلوط بردو)	۸۱

۸۲	بردو (مخلوط بردو)	بردو فیکس	۲۰٪	SC	-	بیماری غربالی	درختان میوه	۷ روز	۴ کیلو گرم سولفات مس ۵ آبه ۲+ کیلو گرم هیدروکسید کلسیم در ۱۰۰ لیتر آب برای سمپاشی با LV	۴۷/۱۰/۱
۸۳	بردو (مخلوط بردو)	بردو فیکس	۲۰٪	SC	-	پیچیدگی برگ	هلو	۷ روز	۴ کیلو گرم سولفات مس ۵ آبه ۲+ کیلو گرم هیدروکسید کلسیم در ۱۰۰ لیتر آب برای سمپاشی با LV	۴۷/۱۰/۱
۸۴	بردو (مخلوط بردو) (۴/۵٪ یون مس)	بردو طیف	۱۸٪	SC	فرآورده-های طیف سبز	بیماری غربالی	زردالو	۷ روز	۱۵ در هزار	۹۹/۴/۳۰
۸۵	بردو (مخلوط بردو) (۱۰٪ یون مس)	MANIFLOW		SC	خزرسم کود مانیکا ایتالیا	سفیدک داخلی	سیب زمینی	۳ روز	۵ لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۹/۱۵
۸۶	بردو (مخلوط بردو: پیک دوتایی سولفات مس + هیدروکسید کلسیم)	-	-	جامد ۱٪	-	لکه آجری	بادام	۷ روز	در سه مرحله	۹۶/۱۱/۳۰
۸۷	بردو (مخلوط بردو) ۱۵٪ (CU) + فوزتیل آلومینیوم ۱۸٪	توتور	۳۳٪	WP	خزرسم کود	سفیدک داخلی	خیار	۷ روز	۳ کیلوگرم در هکتار در تناوب با سایر قارچ کش های ثبت شده	۹۹/۶/۲۴
۸۸	مخلوط بردو	فانجی گارد	۲۴٪	WP	گیاه	شانکر باکتریایی	درختان میوه هسته دار	-	۶ در هزار	۱۴۰۳/۶/۲۶
۸۹	مخلوط بردو ۲۲/۵٪ + سیموکسانیل ۳٪	فستیوال	۲۵/۵٪	WP	سیا کوشا کشت Lainco S A	سفیدک داخلی	سیب زمینی	۱۵ روز	۲ کیلوگرم در مراحل اولیه بیماری و ۲.۵ کیلوگرم در مراحل پیشرفته بیماری با مقدار آب مصرفی	۱۴۰۴/۲/۲۲

۹۰	بوسکالید ۲/۲۵٪+ پیراکلواستروبین ۱۲/۸٪	یونیلیس	۳۸٪	WG	بازرگانان سرای سپند پارس Shandong Kangqiao	سفیدک پودری	گوجه فرنگی	۳ روز	یک در هزار(حداکثر دو بار در سال)	۹۸/۱۰/۳۳
۹۱	بوسکالید ۲/۲۵٪+ پیراکلواستروبین ۱۲/۸٪	بلیس	۳۸٪	WG	ب آ اس اف	سفیدک پودری	هلو- شلیل	۷ روز	۰/۷ در هزار مناطق خشک، ۱ در هزار مناطق مرطوب	۸۹/۹/۲۹
۹۲	بوسکالید ۲/۲۵٪+ پیراکلواستروبین ۱۲/۸٪	بلیس	۳۸٪	WG	ب آ اس اف	سفیدک پودری	سیب درختی	۷ روز	۰/۷ در هزار و در تناوب با سایر قارچکش-ها و حداکثر دوبار در سال	۹۷/۱۲/۱۳
۹۳	بوسکالید ۲۶۷ گرم/کیلوگرم+ پیراکلواستروبین ۶۷ گرم/کیلوگرم	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	آلترناریا	پودری گوجه فرنگی	۳ روز	۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۹۴/۱۲/۱۰
۹۴	بوسکالید ۲۶۷ گرم/کیلوگرم+ پیراکلواستروبین ۶۷ گرم/کیلوگرم	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	آلترناریا	سیب زمینی	۳ روز	۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۹۵/۳/۱۷
۹۵	بوسکالید ۲۶۷ گرم/کیلوگرم+ پیراکلواستروبین ۶۷ گرم/کیلوگرم	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	کپک خاکستری	توت فرنگی گلخانه	۳ روز	۱/۵ در هزار و در تناوب با سایر قارچ-کش-ها و حداکثر دوبار در سال	۹۸/۱۱/۲۸
۹۶	بوسکالید ۲۶۷ گرم/کیلوگرم+ پیراکلواستروبین ۶۷ گرم/کیلوگرم	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	افتادگی برگ	کاهو	۳ روز	۱/۵ کیلو گرم در هکتار حداکثر دو مرحله و با رعایت فاصله ۱۴ روز تا برداشت استفاده شود.	۹۹/۳/۱۲
۹۷	بوسکالید ۲۶۷ گرم/کیلوگرم+ پیراکلواستروبین ۶۷ گرم/کیلوگرم	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	کپک خاکستری	خیار	۳ روز	۱/۲۵ در هزار	۱۴۰۰/۷/۲۶

۹۸	بوسکالید ۲۶۷ گرم/کیلوگرم + پیراکلوستروبین ۶۷ گرم/کیلوگرم	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	سوختگی استمفیلیومی برگ	سیر	۳ روز	۱۲۰۰ گرم در هکتار	۱۴۰۳/۴/۱۱
۹۹	بوسکالید ۲۶۷ گرم/کیلوگرم + پیراکلوستروبین ۶۷ گرم/کیلوگرم	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	کپک خاکستری	فلفل گلخانه ای	۳ روز	۱ در هزار	۱۴۰۳/۷/۱۶
۱۰۰	بوسکالید ۲۰۰ گرم/کیلوگرم + کرزوکسیم متیل ۱۰۰ گرم/کیلوگرم	کولیس	۳۰٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	هلو- شلیل	۷ روز	۰/۵ در هزار	۸۹/۹/۲۹
۱۰۱	بوسکالید ۲۰۰ گرم/کیلوگرم + کرزوکسیم متیل ۱۰۰ گرم/کیلوگرم	کولیس	۳۰٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	خیار	۳ روز	۰/۴ در هزار	۹۶/۹/۱۳
۱۰۲	بوسکالید ۲۰۰ گرم/کیلوگرم + کرزوکسیم متیل ۱۰۰ گرم/کیلوگرم	کولیس	۳۰٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	گوجه فرنگی (فضای باز)	۳ روز	۰/۵ در هزار	۹۸/۴/۱۰
۱۰۳	بی تر تانول	بایکور	۲۵٪	WP	بایرکروپ ساینس	لکه سیاه	سیب	-	۰/۷۵ در هزار	۷۳/۴/۱۳
۱۰۴	بی کربنات پتاسیم	کالیبان	۸۵٪	SP	کیمیا سبز آور	سفیدک پودری	جالیز- گلخانه	-	۵ در هزار	۹۰/۱۲/۱
۱۰۵	پایدیفلومتوفن ۷۵ (آدپیدین) گرم/کیلوگرم + دیفنوکونازول ۱۲۵ گرم/کیلوگرم	میراویس دیوو	۲۰٪	SC	سینجنتا	سفیدک پودری	انگور	۳ روز	۰/۷ در هزار	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۱۰۶	پایدیفلومتوفن ۷۵ (آدپیدین) گرم/کیلوگرم + دیفنوکونازول ۱۲۵ گرم/کیلوگرم	میراویس دیوو	۲۰٪	SC	سینجنتا	سفیدک پودری	سیب	-	۰/۸ در هزار	۱۴۰۲/۵/۳۰
۱۰۷	پروپامو کارب هیدروکلراید	پروپلنت	۷۲/۲٪	SL	اگریفار	بوته میری <i>Pythium aphnidermat um</i>	خیار	۳ روز	۱ در هزار در زمان کشت بذر و انتقال نشا و ۰/۷۵ در هزار دو هفته پس از انتقال نشا	۹۶/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۹/۲۹	۲ در هزار	۳-۷ روز	خيار	سفیدک داخلی	دلتا پارس نهاده	SC	۴۵٪	ریوالدو	پروپامو کارب هیدروکلراید ۴۰٪+ سیمو کسانیل ۵٪	۱۰۸
	۲ لیتر در هکتار در فضای باز				آگریا					
۱۴۰۳/۹/۵	۲ لیتر در هکتار و حداکثر دو بار محلول پاشی	۷ روز	گوجه فرنگی	سفیدک داخلی	دلتا پارس نهاده	SC	۴۵٪	ریوالدو	پروپامو کارب هیدروکلراید ۴۰٪+ سیمو کسانیل ۵٪	۱۰۹
					آگریا					
۹۴/۷/۶	۲/۵ لیتر در هکتار	۱۴ روز	سیب زمینی	سفیدک داخلی	اگریفار	SC	۴۵٪	پروکسانیل	پروپامو کارب هیدروکلراید ۴۰٪+ سیمو کسانیل ۵٪	۱۱۰
۹۲/۸/۷	۲ در هزار	۱ روز	خيار- گلخانه	سفیدک داخلی	بایر آگ	SC	۶۸/۷۵٪	اینفینیتو	پروپامو کارب هیدروکلراید ۶۲۵ گرم/لیتر + فلوپیکولید ۶۲/۵ گرم /لیتر	۱۱۱
۹۴/۷/۶	۱/۲ لیتر در هکتار	۷ روز	سیب زمینی	سفیدک داخلی	بایر آگ	SC	۶۸/۷۵٪	اینفینیتو	پروپامو کارب هیدروکلراید ۶۲۵ گرم/لیتر + فلوپیکولید ۶۲/۵ گرم /لیتر	۱۱۲
۹۲/۷/۸	۳ لیتر در هکتار در مزرعه به صورت شنی در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار ۰/۳ لیتر در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک	۳ روز	خيار	بوته میبری	بایر آگ	SL	۸۴٪	پروپیکورانرزی (Previcur)	پروپامو کارب هیدروکلراید ۵۳٪+ فوزتیل آلومینیوم ۳۱٪	۱۱۳
۷۷/۱۱/۲۶	۱ لیتر در هکتار به صورت محلول پاشی و در صورت آلودگی ۳۰٪ از ساقه های برنج	۳۰ روز	برنج	شیت بلایت	سینجنتا	EC	۲۵٪	تیلت	پروپیکونازول	۱۱۴

۱۱۵	پروپیکونازول	تیلت	۲۵٪	EC	سینجنتا	فوزاریوم خوشه	گندم	۳۰ روز	۱ لیتر در هکتار حداقل یک نوبت سمپاشی در مرحله گلدهی و در صورت نیاز تکرار سمپاشی به فاصله ۷ روز	۷۷/۶/۹
۱۱۶	پروپیکونازول	تیلت	۲۵٪	EC	سینجنتا	زنگ	گندم	۳۰ روز	۱ لیتر در هکتار (۹۶/۱۲/۱۳)	۷۵/۱/۲۷
۱۱۷	پروپیکونازول	بهتیل	۲۵٪	EC	بهاور شیمی آستک	زنگ زرد	گندم	۳۰ روز	یک لیتر در هکتار بر اساس پیش آگاهی	۹۷/۱۲/۱۳
۱۱۸	پروپیکونازول ۱۵٪+ دیفنوکونازول ۱۵٪	هاربور	۳۰٪	EC	گیاه پرنیان اطلس	سپتوریز	گندم	۲۱ روز	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۹/۶/۲۴
					Safa tarim					
۱۱۹	پروپیکونازول ۲۵٪+ سایپروکونازول ۸٪	آرتا	۳۳٪	EC	سینجنتا	زنگ زرد	گندم	۴۲ روز	۰/۳ لیتر در هکتار در مرحله تورم خوشه	۸۲/۳/۱۹
۱۲۰	پروپیکونازول ۲۵٪+ سایپروکونازول ۸٪	آرتا	۳۳٪	EC	سینجنتا	سپتوریز	گندم	۴۲ روز	۰/۴ لیتر در هکتار در مرحله تورم خوشه و مشاهده اولین علائم	۸۳/۱۰/۳۱
۱۲۱	پروپیکونازول ۱۲/۵٪+ فلوکسایپروکسادی ۳٪+ پیراکلواستروبین ۲۰٪	اینور	۳۵/۵٪	EC	ب آ اس اف	زنگ زرد	گندم	۳۵ روز	نیم لیتر در هکتار	۹۷/۱۲/۱۳
۱۲۲	پروتیو کونازول ۲۵٪+ تیو کونازول ۱۵٪	لاماردور	۴۰٪	FS	بایر آگ	سیاهک پنهان معمولی	گندم	-	۱۰-۱۵ میلی لیتر برای یکصد کیلو گرم بذر	۸۹/۳/۱۰
۱۲۳	پروتیو کونازول ۲۵٪+ تیو کونازول ۱۵٪	لاماردور	۴۰٪	FS	بایر آگ	سیاهک آشکار	گندم	-	۲۰ میلی-لیتر برای یکصد کیلو گرم بذر	۸۹/۹/۱
۱۲۴	پروتیو کونازول ۲۵٪+ تیو کونازول ۱۵٪	لاماردور	۴۰٪	FS	بایر آگ	سیاهک آشکار	جو	-	۱۵ میلی-لیتر برای یکصد کیلو گرم بذر	۹۶/۴/۱۹

۱۲۵	پروتیو کونازول ۱۵٪+ تیو کونازول ۲٪	ردیگوپرو	۱۷٪	FS	بایر آگ	سیاهک آشکار	گندم	-	۰/۵ میلی لیتر در کیلوگرم بذر	۱۴۰۴/۲/۱
۱۲۶	پروتیو کونازول ۱۵٪+ تیو کونازول ۲٪	ردیگوپرو	۱۱۷٪	FS	بایر آگ	سیاهک پنهان	گندم		۰/۵ در هزار	۱۴۰۳/۲/۳
۱۲۷	پرکلراز	اسپورگون	۵۰٪	WP	بایر کروپ ساینس	پوسیدگی خشک	قارچ خوراکی	۱۰ روز	۰/۹ گرم در متر مربع	۸۴/۲/۱۹
۱۲۸	پرکلراز	آکورد	۵۰٪	WP	فرتی اگرو	پوسیدگی خشک	قارچ خوراکی	۱۰ روز	۰/۹ گرم در هر متر مربع	۹۲/۸/۲۷
۱۲۹	پنسیکرون	مونسرن	۲۵٪	FS	بایر آگ	شانکر ریزوکتونایی ساقه و شوره سیاه	سیب زمینی	-	۱- ۱/۲۵ در هزار (ضد عفونی بذر)	۹۹/۴/۳۰
۱۳۰	پنسیکرون	مونسرن	۲۵٪	WP	بایر آگ	شانکر ریزوکتونایی ساقه و شوره سیاه	سیب زمینی	-	۱/۲۵ در هزار (ضد عفونی بذر)	۸۶/۲/۳
۱۳۱	پنفلوفن	امستوپرایم	۵٪	FS	بایر	شانکر ریزوکتونایی و شوره سیاه	سیب زمینی	-	۴۰۰ میلی لیتر برای ۱۰۰۰ کیلوگرم غده بذر به صورت ضد عفونی	۱۴۰۲/۴/۱۹
۱۳۲	پنکونازول	توپاز	۲۰٪	EW	سینجنتا	سفیدک پودری	انگور	۱۴ روز	۰/۱۲۵ در هزار	۷۹/۱۲/۱۵
۱۳۳	پیراکلواستروبین	سلتیم	۱۰٪	CS	BASF	بلاست	برنج	۳۵ روز	۱۰۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۳/۳/۲۱
۱۳۴	پیراکلواستروبین ۶/۷٪+ دیمتومورف ۱۲٪	پیرادیم	۱۸/۷٪	DF	برزرگر برجسته جیانگ سوگرین سای	سفیدک داخلی	خیار(گلخانه)	۳ روز	۰/۳۵ در هزار (بیش از سه نوبت متوالی و بیش از شش نوبت در یک دوره تولید ممنوع است).	۹۷/۱۰/۱۷

۱۳۵	پیراکلواستروبین ۷/۶٪ + دیمتومورف ۱۲٪	پیرادیم	۱۸/۷٪	DF	برزگر برجسته	سوختگی الترناریایی	پسته	-	۰/۷۵ در هزار	۱۴۰۱/۴/۲۰
					Jiangsu Greenscie Chemical					
۱۳۶	پیراکلواستروبین ۱۵٪ + فلوکسپایروکساد ۷/۵٪	پریاکسور	۲۲/۵٪	EC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	گندم	۳۵ روز	۱/۵ لیتر در هکتار	۹۹/۳/۱۲
۱۳۷	پیری متانیل	میلیس	۳۰٪	SC	گیاه پرنیان اطلس	کپک خاکستری	توت فرنگی گلخانه	-	یک در هزار و در تناوب با سایر قارچ-کشها و حداکثر دوبار درسال	۹۸/۱۱/۲۸
					Safa tarim					
۱۳۸	پیری متانیل ۱۸۷/۲ گرم/لیتر + روغن میخک ۱۸۵ گرم/لیتر	زداتان ۲۰	EC	EC	دانش میوه خاورمیانه	کپک سبز	مرکبات	-	دو در هزار	۱۴۰۳/۳/۲۱
					فرانسه Xeda					
۱۳۹	پیری متانیل ۱۸۷/۲ گرم/لیتر + روغن میخک ۱۸۵ گرم/لیتر	زداتان ۲۰	EC	EC	دانش میوه خاورمیانه	پیشگیری کننده و درمان کننده	گلابی	-	۲/۵ در هزار	۱۴۰۳/۱۱/۱۵
					فرانسه Xeda					
۱۴۰	پیری متانیل ۱۴/۰٪ + صمغ گیاهی کارنوبا ۱۹٪	مکسی فرش		واکس آماده مصرف	دانش میوه خاورمیانه	کپک سبز	مرکبات	-	۲ لیتر به ازای هر کیلو میوه	۱۴۰۳/۳/۲۱
					پیری متانیل تولید شرکت xeda فرانسه					
۱۴۱	Pythium Oligandrum Drechsler	پلی ورسوم		WP	بازارگان کالا	عامل پیشگیرانه بیماری گیاهچه میری	خیار گلخانه	-	۰/۴-۰/۳ در هزار در طول فصل رویش همراه با آب آبیاری دوبار در فصل کاشت	۱۴۰۰/۹/۱۵
					Bioprepara ly					

۱۴۲	تالارومیسس فلاووس	تالارومین	۱۰ ^۹	ذرات جامد قابل انتشار در آب	بهاران دشت ساحل	پژمردگی ورتیسیلیومی	سیب زمینی	ندارد	۶۰ کیلوگرم برای بذرمال ۴ تن غده سیب زمینی در هکتار	۹۷/۲/۳۰
۱۴۳	تبو کونازول	فولیکور	۲۵٪	EW	بایر آگ	پوسیدگی	ساقه کلزا	-	۱ لیتر در هکتار	۹۴/۳/۱۱
۱۴۴	تبو کونازول	فولیکور	۲۵٪	EW	بایر کروپ ساینس	زنگ زرد	گندم		۱ لیتر در هکتار	۷۵/۱/۲۷
۱۴۵	تبو کونازول	راکسیل	۶٪	FS	بایر کروپ ساینس	سیاهک پنهان معمولی	گندم		۰/۵ در هزار (۵۰ میلی لیتر برای ۱۰۰ کیلوگرم بذر)	۷۷/۱۱/۱۲
۱۴۶	تبو کونازول	راکسیل	۲٪	DS	بایر کروپ ساینس	سیاهک آشکار	گندم		۱/۵ در هزار	۷۸/۴/۱۴
۱۴۷	تبو کونازول	آرتمیس	۶٪	FS	بیسترفیلد	سیاهک پنهان معمولی	گندم	-	۵۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	۹۵/۹/۲۹
۱۴۸	تبو کونازول	تبوکور	۲۵٪	EW	گل سم گرگان	زنگ زرد	گندم	-	یک لیتر در هکتار	۹۷/۱۲/۱۳
					نینگ بوسانجوی					
۱۴۹	تبو کونازول	تایدتیو	۴۰٪	SC	گیاه پرnian اطلس	زنگ زرد	گندم	-	۰/۴ لیتر در هکتار	۹۷/۱۲/۱۳
					تاید کراپ-ساینس					
۱۵۰	تتراکونازول	لوسپل	۱۲/۵٪	LS	ایزاگرو	سیاهک آشکار	گندم	-	۱۰۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلوگرم بذر	۸۹/۱۰/۱۳
						سیاهک پنهان		-	۳۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلوگرم بذر	
					آریاشیمی					

۹۸/۱۰/۲۳	یک در هزار	-	رز	سفیدک پودری	Ningbo Sunjoy Jiangsu	SC	۳۲٪	آذیلون	تیکونازول ۲۰٪+ آزوکسی استروبین ۱۲٪	۱۵۱
۱۴۰۰/۹/۱	۰/۶ لیتر در هکتار	-	گندم	سفیدک پودری	ساعی گل تهران	SC	۳۴/۵٪	پیلار تب	تیکونازول ۲۳٪ + پیراکلواستروبین ۱۱/۵٪	۱۵۲
					Jiangsu Mindleader crop science					
۱۴۰۱/۴/۲۰	۰/۶ در هزار	-	هلو	سفیدک پودری	بازرگان کالا	SC	۱۸٪	افیانس	تتراکونازول ۸٪+آزوکسی استروبین ۱۰٪	۱۵۳
					Isagro					
۱۴۰۲/۳/۲۹	۶۰۰ میلی لیتر در هکتار	۳ روز	گوجه فرنگی	لکه مویی	بازرگان کالا	SC	۱۸٪	افیانس	تتراکونازول ۸٪+آزوکسی استروبین ۱۰٪	۱۵۴
					Isagro					
۸۸/۸/۱۱	۰/۵ لیتر در هکتار در	۳ روز	جالیز	سفیدک پودری	Isagro	EC	۱۰٪	دومارک	تتراکونازول	۱۵۵
	مزرعه ۰/۴ در هزار در گلخانه									
۹۲/۳/۲۷	۰/۳ در هزار	۱۴ روز	سیب	سفیدک پودری	Isagro	EC	۱۰٪	دومارک	تتراکونازول	۱۵۶
۹۰/۷/۴	۰/۸-۱ لیتر در هکتار	۲۱ روز	چغندر قند	سفیدک پودری	Isagro	ME	۱۲/۵٪	امی ننت	تتراکونازول	۱۵۷
۸۹/۳/۱۰	۲۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلوگرم بذر	-	جو	سیاهک آشکار	ب آ اس اف	FS	۲۰٪	رئال	تری تیکونازول	۱۵۸
۷۷/۱۱/۱۲	۲۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلوگرم بذر	-	گندم	سیاهک پنهان معمولی	بایر کروب ساینس	FS	۲۰٪	رئال اف اس ۲۰۰	تری تیکونازول	۱۵۹

۱۶۰	تری دیمورف	کالکسین	۷۵٪	EC	ب آ اس اف	سفیدک حقیقی	چغندر قند		۰/۷۵ لیتر در هکتار از اوایل تیرماه به بعد	۵۶/۶/۷
۱۶۱	تری سیکلازول	بیم	۷۵٪	WP	داو اگرو ساینس	بلاست	برنج	۳۵ روز	محلول پاشی ۰/۵ کیلو گرم از ظهور ۳۰-۴۰ درصد از خوشه ها	۶۶/۸/۴
۱۶۲	تری فلوکسی استروبین	فلینت	۵۰٪	WG	بایر آگ	سفیدک پودری	جالیز (خیار در مزرعه)	۱ روز	۲۰۰ گرم در هکتار	۸۸/۸/۱۱
۱۶۳	تری فلوکسی استروبین	فلینت	۵۰٪	WG	بایر آگ	لکه سیاه	سیب	۷ روز	۰/۲ در هزار	۸۳/۸/۱۱
۱۶۴	تری فلوکسی استروبین	فلینت	۵۰٪	WG	بایر آگ	سفیدک پودری	سیب	۷ روز	۰/۲ در هزار	۸۲/۴/۹
۱۶۵	تری فلوکسی استروبین	فلینت	۵۰٪	WG	بایر آگ	سفیدک پودری	گوجه فرنگی- مزرعه	۱ روز	۲۵۰ گرم در هکتار	۹۶/۵/۲
۱۶۶	تری فلوکسی استروبین ۱۴٪+بوسکالید۴۲٪		۵۶٪	SC	ناردان توسعه یزد	سفیدک پودری	انگور	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۱۴۰۳/۵/۲۲
۱۶۷	تری فلوکسی استروبین۲۵٪+ تیبوکونازول۵۰٪	ناتیوو	۷۵٪	WG	بایر آگ	بلاست	برنج	۲۱ روز	۱۶۰ گرم در هکتار	۹۲/۳/۶
۱۶۸	تری فلوکسی استروبین۲۵٪+ تیبوکونازول۵۰٪	ناتیوو	۷۵٪	WG	بایر آگ	لکه سیاه	سیب	۱۴ روز	۰/۳-۰/۲ در هزار	۹۴/۵/۱۲
۱۶۹	تری فلوکسی استروبین۲۵٪+ تیبوکونازول۵۰٪	ناتیوو	۷۵٪	WG	بایر آگ	سفیدک پودری	سیب	۱۴ روز	۰/۳ در هزار	۹۵/۶/۱
۱۷۰	تری فلوکسی استروبین۲۵٪+ تیبوکونازول۵۰٪	ناتیوو	۷۵٪	WG	بایر آگ	سفیدک پودری	چغندر قند	-	۲۰۰ گرم در هکتار	۹۵/۶/۱
۱۷۱	تری فلوکسی استروبین۲۵٪+ تیبوکونازول۵۰٪	ناتیوو	۷۵٪	WG	بایر آگ	شیت بلایت	برنج	۲۱ روز	۱۶۰ گرم در هکتار	۹۶/۹/۱۳
۱۷۲	تری فلوکسی استروبین۲۵٪+ تیبوکونازول۵۰٪	اوت (evet)	۷۵٪	WG	گل سم گرگان	بلاست	برنج	۲۱ روز	۱۶۰ گرم در هکتار	۹۸/۱۱/۱۴

۹۸/۱۱/۱۴	۱۶۰ گرم در هکتار	-	برنج	بلاست	سرای سپند CAC Nantong	WG	۷۵٪	فلونازول	تری فلوکسی استروبین ۲۵٪+ تبوکونازول ۵۰٪	۱۷۳
۹۸/۱۱/۱۴	۳۲۰ میلی لیتر در هکتار	-	برنج	بلاست	پاک سم ایرانیان &sunjoy CAC Nanton	SC	۳۷/۵٪	تیلما	تری فلوکسی استروبین ۱۲/۵٪+ تبوکونازول ۲۵٪	۱۷۴
۹۶/۲/۲۵	۰/۲ در هزار	۱۴ روز	سیب	سفیدک پودی	بایر آگ	SC	۵۰٪	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین ۲۵٪+ فلوپیرام ۲۵٪	۱۷۵
۹۶/۳/۱	۰/۲ در هزار	۱۴ روز	سیب	لکه سیاه	بایر آگ	SC	۵۰٪	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین ۲۵٪+ فلوپیرام ۲۵٪	۱۷۶
۹۶/۳/۱	۰/۲ در هزار	۳ روز	خیار-گلخانه	سفیدک پودی	بایر آگ	SC	۵۰٪	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین ۲۵٪+ فلوپیرام ۲۵٪	۱۷۷
۹۶/۵/۲	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۵ روز	گوجه فرنگی- مزرعه	سفیدک پودی	بایر آگ	SC	۵۰٪	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین ۲۵٪+ فلوپیرام ۲۵٪	۱۷۸
۱۴۰۰/۷/۲۶	۰/۴ در هزار	-	خیار	کپک خاکستری	بایر آگ	SC	۵۰٪	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین ۲۵٪+ فلوپیرام ۲۵٪	۱۷۹
۹۹/۱۰/۹	یک در هزار	-	سیب	سفیدک پودی	نپون سودا	EC	۱۵٪	تریفمین	تری فلو میزول	۱۸۰
۸۱/۴/۱۰	۳۳ میلی لیتر برای ضد عفونی ۱۰۰ کیلو بذر (منحصرا برای کاربرد در شمال کشور)		برنج	پوسیدگی طوقه	نیپون سودا	EC	۱۵٪	تریفمین	تری فلو میزول	۱۸۱
۹۹/۱۰/۱	۷۵ / ۰ در هزار	۱۴ روز	هلو	سفیدک پودی	رهاندیش کاوان	WG	۱۸/۴٪	پانچو تی اف	تری فلو میزول ۱۵٪ + سایفلونامید ۳/۴٪	۱۸۲
۱۴۰۰/۴/۱۴	۷۵ / ۰ در هزار	۱۴ روز	هلو	مومیایی	نپون سودا	WG	۱۸/۴٪	پانچو تی اف	تری فلو میزول ۱۵٪ + سایفلونامید ۳/۴٪	۱۸۳

۱۸۴	تریپتوکونازول ۸٪+پیراکلواستروبین ۴٪	اینشورپر فرم	۱۲٪	FS	ب آ اس اف	سیاهک پنهان معمولی	گندم	-	۰/۵- ۰/۴ در هزار	۹۸/۱۲/۲۸
۱۸۵	تریپتوکونازول ۸٪+پیراکلواستروبین ۴٪	اینشورپر فرم	۱۲٪	FS	ب آ اس اف	سیاهک آشکار	گندم	-	۰/۵ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱
۱۸۶	تریفورین	ساپرول	۱۹٪	DC	سومیتومو	لکه آجری	بادام	-	۰/۳ در هزار	۹۶/۱۱/۳۰
۱۸۷	تریکودرما هارزیانوم	تریانوم پی	۱۰ ^۹	P	گیاه کوپرت هلند	پژمردگی فوزاریومی	گوجه فرنگی گلخانه	ندارد	۳۰-۴۰ گرم برای هزار گیاه	۹۱/۲/۹
۱۸۸	تریکودرما هارزیانوم	تریانوم پی	۱۰ ^۹	WP	گیاه کوپرت هلند	پژمردگی فوزاریومی	خیار گلخانه	ندارد	۳۰-۴۰ گرم برای هزار گیاه	۹۱/۲/۹
۱۸۹	تریکودرما هارزیانوم	تریانوم جی	۱۰ ^۹	G	گیاه کوپرت هلند	پژمردگی فوزاریومی	طالبی	ندارد	۲۰-۱۵ کیلوگرم در هکتار	۹۷/۹/۲۱
۱۹۰	تریکودرما هارزیانوم	تریانوم جی	۱۰ ^۸	G	گیاه کوپرت هلند	پژمردگی فوزاریومی	گوجه فرنگی گلخانه	ندارد	۳۷۵-۲۵۰ گرم در متر مکعب	۹۷/۹/۲۱
۱۹۱	سه جدایه موتانت تریکودرما	-	۱۰ ^۸	WP	پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای	پوسیدگی زغالی	سویا	ندارد	۱/۵ کیلوگرم با ۳۰۰ لیتر آب در هکتار	۱۴۰۳/۳/۲۱
۱۹۲	تیابندازول	تکتو	۶۰٪	WP	سینجنتا	مرگ گیاهچه	حبوبات		۲ در هزار به طریق ضد عفونی بذر	۵۳/۶/۳۰
۱۹۳	تیابندازول	تکتو	۶۰٪	WP	سینجنتا	بیماری انبار	مرکبات		۱-۱/۵ در هزار به طریق ضد عفونی بذر	۵۳/۶/۳۰
۱۹۴	تیابندازول ۲/۵٪+فلوتریافول ۲/۵٪	وینسیت پی	۵٪	DS	زنکا	سیاهک پنهان	گندم		۲ در هزار به طریق ضد عفونی بذر	۷۰/۳/۶
۱۹۵	تیفلوزامید	آچمز	۲۴٪	SC	گروه شهر سبز و Shandong kangqiao	سوختگی غلاف برگ برنج(شیت بلایت)	برنج	۲۱ روز	۳۰۰ سی سی در هکتار در تناوب با سایر قارچ کش ها	۹۹/۳/۲۶
۱۹۶	تیوفانات متیل	توپسین ام	۷۰٪	WP	نیپون سودا	سیاهک پنهان و آشکار	گندم		۱۵۰ گرم برای یکصد کیلوگرم بذر	۵۰/۳/۲۳

۱۹۷	تیوفانات متیل	توپسین ام	۷۰٪	WP	نیپون سودا	پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه	درختان میوه سرد سیری		۵۰-۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب نزدیک طوقه درخت	۵۰/۳/۲۳
۱۹۸	تیوفانات متیل	توپسین ام	۷۰٪	WP	نیپون سودا	سفیدک پودری	درختان میوه		۵۰-۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب	۵۰/۳/۲۳
۱۹۹	تیوفانات متیل	توپسین ام	۷۰٪	WP	نیپون سودا	پوسیدگی قهوه ای	هلو		۵۰-۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب	۵۰/۳/۲۳
۲۰۰	تیوفانات متیل	توپسین ام	۷۰٪	WP	نیپون سودا	لکه سیاه	سیب	۷-۱۴ روز	۵۰-۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب	۵۰/۳/۲۳
۲۰۱	تیوفانات متیل	توپسین ام	۷۰٪	WP	نیپون سودا	لکه سیاه	گلابی		۵۰-۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب	۵۰/۳/۲۳
۲۰۲	تیوفانات متیل	توپسین ام	۷۰٪	WP	نیپون سودا	لکه سفید	گلابی		۵۰-۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب	۵۰/۳/۲۳
۲۰۳	تیوفانات متیل	توپسین ام	۷۰٪	WP	نیپون سودا	پوسیدگی سفید ریشه	درختان میوه		۵۰-۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب نزدیک طوقه درخت	۵۰/۳/۲۳
۲۰۴	تیوفانات متیل ۳۵٪ + تری سیکلازول ۳۷/۵٪	ویستا	۷۲/۵٪	WP	نیپون سودا ژاپن	بلاست برگ و خوشه	برنج	۲۱ روز	۵/۴-۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۹۰/۳/۳۰
۲۰۵	تیوفانات متیل ۵۰٪ + تیرام ۳۰٪	همای کت	۸۰٪	WP	نیپون سودا ژاپن	پوسیدگی طوقه	برنج		۳ گرم سم برای هر کیلو بذر فقط در مناطق برنج کاری شمال کشور	۸۰/۸/۲۸
۲۰۶	۱۰٪ روغن سیر (۰/۰۳٪ آلیسین) + ۳٪ اسانس میخک (۲/۲٪ اوژنول)	میلدیوکات Mildew Cut	۱۳٪	EC	پژوهشکده گیاهان دارویی	سفیدک پودری	خیار گلخانه ای	-	۵ در هزار	۱۴۰۳/۱۲/۱۱
۲۰۷	روغن میخک ۱۰٪ + صمغ گیاهی کارنوبا ۹۰٪	Fresh Save HN		EC	دانش میوه خاورمیانه	پیشگیری کننده و درمان کننده کپک خاکستری	گلابی	-	۷ در هزار	۱۴۰۳/۱۱/۱۵
۲۰۸	دودین	ملپرکس	۶۵٪	WP	ب آ اس اف	لکه سیاه	سیب		۱ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۰۹	دیتیانون	دلان	۵۰٪	SC	ب آ اس اف	لکه سیاه	سیب	۴۵ روز	۰/۷۵ در هزار	۱۴۰۲/۵/۳۰
۲۱۰	دیفنو کونا زول	دیویدند	۳٪	DS	سینجنتا	سیاهک پنهان پا کوتاه	گندم		۲۰۰ گرم برای ۱۰۰ کیلو بذر	۷۷/۸/۴

۲۱۱	دیفنو کونازول	دیویدند	۳٪	DS	سینجنتا	سیاهک پنهان معمولی	گندم		۱ در هزار برای ضد عفونی بذر	۷۸/۳/۱۷
۲۱۲	دیفنو کونازول	دیویدند	۳٪	DS	سینجنتا	سیاهک آشکار	گندم		۲ در هزار	۷۸/۴/۱۴
۲۱۳	دیفنو کونازول	دیویدند ام ۰۳۰	۳٪	FS	سینجنتا	سیاهک پنهان معمولی	گندم		۱ در هزار برای ضد عفونی بذر	۷۹/۹/۲۱
۲۱۴	دیفنو کونازول	دیویدند ام ۰۳۰	۳٪	FS	سینجنتا	سیاهک پنهان پا کوتاه	گندم		۱ در هزار برای ضد عفونی بذر	۸۶/۲/۳
۲۱۵	دیفنو کونازول ۳٪+ سایپرو کونازول ۰/۶۳٪	دیویدند استار	۳/۶۳٪	FS	سینجنتا	سیاهک آشکار	جو	-	۲۰۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	۸۹/۳/۱۰
۲۱۶	دیفنو کونازول ۳٪+ سایپرو کونازول ۰/۶۳٪	دیویدند استار	۳/۶۳٪	FS	سینجنتا	سیاهک آشکار	گندم	-	۱۰۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	۸۹/۹/۱
۲۱۷	دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/لیتر+ سیفلوفنامید ۱۵ گرم/لیتر	سیدلی تاپ	۱۴٪	DC	سینجنتا	سفیدک پودری	خیار در شرایط گلخانه-ای	۷-۱۴ روز	۱ در هزار (عدم کاربرد بیش از دو نوبت در طول یک فصل)	۹۷/۸/۱۴
۲۱۸	دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/لیتر+ سیفلوفنامید ۱۵ گرم/لیتر	سیدلی تاپ	۱۴٪	DC	سینجنتا	سوختگی استمفیلیومی برگ	سیب	۱۵ روز	۱۰۰۰ میلی لیتر در هکتار با فاصله ۷-۱۰ روز به صورت متناوب	۱۴۰۳/۴/۱۱
۲۱۹	دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/لیتر+ سیفلوفنامید ۱۵ گرم/لیتر	سیدلی تاپ	۱۴٪	DC	سینجنتا	سفیدک پودری	سیب	۱۴-۲۸ روز	۰/۷۵ در هزار	۱۴۰۴/۲/۱
۲۲۰	دیفنو کونازول ۵۰ گرم/لیتر+ فلوکسپایروکساز ۷۵ گرم/لیتر (xemium)	داگونیس	۱۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	خیار گلخانه-ای	۳ روز	۰/۵ در هزار	۹۹/۱۰/۲۲
۲۲۱	دیفنو کونازول ۵۰ گرم/لیتر+ فلوکسپایروکساز ۷۵ گرم/لیتر (xemium)	داگونیس	۱۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	سیب	۳ روز	۰/۶ در هزار	۱۴۰۰/۹/۲۲
۲۲۲	دیفنو کونازول ۵۰ گرم/لیتر+ فلوکسپایروکساز ۷۵ گرم/لیتر (xemium)	داگونیس	۱۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	لکه سیاه سیب	سیب	۳ روز	۰/۶ در هزار	۱۴۰۰/۱۲/۹

۲۲۳	دیفنوکونازول ۵۰ گرم/لیتر + فلوکسپایروکساد ۷۵ گرم/لیتر (xemium)	داگونیس	۱۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	لکه موجی	سیب زمینی	۷ روز	۷۵۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۷/۲۵
۲۲۴	دیفنوکونازول ۵۰ گرم/لیتر + فلوکسپایروکساد ۷۵ گرم/لیتر (xemium)	داگونیس	۱۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	لکه موجی	گوجه فرنگی	۳ روز	۱۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۲۲۵	دیفنوکونازول ۵۰ گرم/لیتر + فلوکسپایروکساد ۷۵ گرم/لیتر (xemium)	داگونیس	۱۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	توت فرنگی	۱ روز	۰/۶ در هزار	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۲۲۶	دیفنوکونازول ۵۰ گرم/لیتر + فلوکسپایروکساد ۷۵ گرم/لیتر (xemium)	داگونیس	۱۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	گوجه فرنگی	۳ روز	۶۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۳/۴/۱۱
۲۲۷	دینوکاپ	کاراتان اف ان ۵۷	۱۸/۲۵٪	WP	داو آگرو ساینس	سفیدک پودری	هلو	۲۱ روز	۱ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۲۸	دینوکاپ	کاراتان اف ان ۵۷	۱۸/۲۵٪	WP	داو آگرو ساینس	سفیدک پودری	سیب	۲۱ روز	۱ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۲۹	دینوکاپ	کاراتان اف ان ۵۷	۱۸/۲۵٪	WP	داو آگرو ساینس	سفیدک پودری	انگور	۲۱ روز	۱ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۳۰	دینوکاپ	کاراتان اف ان ۵۷	۱۸/۲۵٪	WP	داو آگرو ساینس	سفیدک پودری	یونجه		۰/۵-۱ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۳۱	دینوکاپ	کاراتان اف ان ۵۷	۱۸/۲۵٪	WP	داو آگرو ساینس	سفیدک پودری	سبزی و جالبیز	۷ روز	۱-۲ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۳۲	دینوکاپ	کاراتان ال سی	۴۸٪	EC	داو آگرو ساینس	سفیدک پودری	توتون		۱ در هزار	۷۹/۷/۱۱
۲۳۳	دینوکاپ	کاراتان ال سی	۴۸٪	EC	داو آگرو ساینس	سفیدک پودری	رز		۰/۵-۱ در هزار	۷۹/۷/۱۱
۲۳۴	دینوکاپ	کاراتان ال سی	۴۸٪	EC	داو آگرو ساینس	سفیدک پودری	اشجار و گیاهان غیر مثمر		۰/۵-۱ در هزار	۷۹/۷/۱۱

۲۳۵	دیمتورف ۷/۲٪+ پیراکلوستروبین ۴٪	کابریو دو	۱۱/۲٪	EC	ب آ اس اف	آلترناریا	گوجه فرنگی	۳ روز	۲ لیتر در هکتار	۹۴/۱۲/۱۰
۲۳۶	دیمتورف ۹٪+ مانکوزب ۶۰٪	آکروبات ام زد	۶۹٪	WG	ب آ اس اف	سفیدک داخلی	سیب زمینی	۷ روز	۲ کیلوگرم در هکتار	۹۴/۸/۲۵
۲۳۷	سایپروکونازول	التو	۱۰٪	SL	سینجنتا	زنگ	گندم	۴۲ روز	۰/۵ در هکتار	۷۴/۱۲/۱۴
۲۳۸	سایپروکونازول ۱۲٪+ کاربندازیم ۳۰٪	آلتو کمبی	۴۲٪	SC	سینجنتا	پوسیدگی اسکروتنیایی	ساقه کلزا	۴۲ روز	۱ لیتر در هکتار	۹۴/۳/۱۱
۲۳۹	سایپروکونازول ۱۲٪+ کاربندازیم ۳۰٪	آلتو کمبی	۴۲٪	SC	سینجنتا	فوزاریوم	سنبله گندم	۴۲ روز	۰/۵ لیتر در هکتار	۸۳/۲/۲۸
۲۴۰	سولفات مس ۱۰/۲٪+ فسفیت پتاسیم ۵۱/۹٪	سراکوئینت	۶۲/۱٪	SP	رهروان رویش سبز	کپک خاکستری	توت فرنگی	-	۳ در هزار در شروع رشد گیاه به صورت محلولپاشی دور خاک بوته	۹۸/۱۰/۹
۲۴۱	سولفور	کومولوس	۸۰٪	DF	BASF	سفیدک پودری	انگور		۳ در هزار	۸۰/۱۱/۸
۲۴۲	سولفور	کومولوس	۸۰٪	DF	BASF	سفیدک پودری	خیار		۳ کیلوگرم در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۴۳	سولفور	تیوویت جت	۸۰٪	WG	سینجنتا	سفیدک پودری	چغندر		۴ کیلوگرم در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۴۴	سولفور	تیوویت جت	۸۰٪	WG	سینجنتا	سفیدک حقیقی	سبزی		۲-۳ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۴۵	سولفور	تیوویت جت	۸۰٪	WG	سینجنتا	سفیدک پودری	هلو		۳-۴ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۴۶	سولفور	تیوویت جت	۸۰٪	WG	سینجنتا	سفیدک پودری	سیب		۳-۴ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۴۷	سولفور	تیوویت جت	۸۰٪	WG	سینجنتا	سفیدک پودری	رز و گیاهان زینتی و غیر مثمر		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۴۸	سولفور	تیوویت جت	۸۰٪	WG	سینجنتا	سفیدک پودری	یونجه		۲-۳ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۴۹	سولفور	سولفولاک	۸۰٪	WG	بیستر فیلد	سفیدک پودری	خیار	۱ روز	۳ کیلوگرم در هکتار	۹۲/۴/۱۷

۲۵۰	سولفور	گوگرد سمیران	۸۰٪	SC	سمیران	سفیدک پودری	انگور	-	۲/۵ در هزار	۹۲/۸/۲۷
۲۵۱	سولفور	سولفور ارکیده سازان	۴۰٪	SC	ارکیده سازان	سفیدک پودری	شلیل	۲۰ روز	۳/۷۵ در هزار	۹۳/۶/۱۰
۲۵۲	سولفور	پارومی دی	۸۰٪	DF	آریا شیمی کروماندل	سفیدک پودری	خیار گلخانه	۱ روز	۳ در هزار با مشاهده اولین علائم و در تناوب با	۹۹/۳/۱۲
۲۵۳	سولفور	سولفیکس	۸۰٪	SC	باغبان تاک	سفیدک پودری	انگور	۲۰ روز	۲/۵ در هزار	۹۸/۳/۲۷
۲۵۴	سولفور میکرونیزه		۸۰-۹۰٪	P		سفیدک پودری	انگور	۲۰ روز	۶۰-۹۰ کیلوگرم در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۵۵	سیازوفامید	رانمن	۴۰٪	SC	ایشیهارا	سفیدک داخلی	خیار- گلخانه	۳ روز	۰/۴-۰/۵ در هزار	۹۱/۳/۸
۲۵۶	سیازوفامید	رانمن	۴۰٪	SC	ایشیهارا	بازدزدگی	سیب زمینی	۷ روز	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۴/۷/۶
۲۵۷	سیازوفامید	رانمن	۱۰٪	SC	ایشیهارا	سفیدک داخلی	خیار- گلخانه	۳ روز	۱/۵ در هزار	۹۶/۵/۲
۲۵۸	سیازوفامید	رگنانت	۲۰٪	SC	بازرگانان سرای سپند پارس شاندوگ هایلر	سفیدک داخلی	خیار(گلخانه)	۳ روز	۰/۶ در هزار (بیش از سه نوبت متوالی و بیش از شش نوبت در یک دوره تولید ممنوع است).	۹۷/۱۰/۱۷
۲۵۹	سیپرودینیل	سیپرودین	۵۰٪	WG	آتیه نگین فلات Shaanxi hengrun chemical industry	پوسیدگی خاکستری	انگور	۱۴ روز	۱ در هزار	۱۴۰/۱/۱۱/۳
۲۶۰	سیپرودینیل ۳۷/۵٪+فلودیوکسانیل ۲۵٪	سویج	۶۲/۵٪	WG	سینجتا	نکروز ساقه	گوچه فرنگی	۳ روز	۱ در هزار	۱۴۰/۲/۵/۹
۲۶۱	سیپرودینیل ۳۷/۵٪+فلودیوکسانیل ۲۵٪	سویج	۶۲/۵٪	WG	سینجتا	کپک خاکستری	توت فرنگی	۳ روز	۰/۸ در هزار	۱۴۰/۲/۵/۹

۲۶۲	سیپرودینیل ۳۷/۵٪+فلودیوکسانیل ۲۵٪	سویچ	۶۲/۵٪	WG	سینجنتا	کپک خاکستری	خیار	۷ روز	۱ در هزار	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۲۶۳	سیموکسانیل ۶۰ گرم/کیلوگرم +هیدروکسید مس ۴۶۱ گرم/کیلوگرم	کوپفورس اکسترا	۵۲/۱٪	WG	دلتا پارس نهاده Zenith Crop Sciences Bulgaria	سفیدک کرکی	انگور	۲۱ روز	۲ در هزار	۱۴۰۳/۱۰/۳
۲۶۴	فاموکسادون ۲۲/۵٪+سیموکسانیل ۳۰٪	اکوشن پرو	۵۲/۵٪	WG	دوپونت	سفیدک داخلی	کدوئیان	۳ روز	۲۰۰ گرم در هکتار	۸۱/۱۲/۱۹
۲۶۵	فاموکسادون ۲۲/۵٪+سیموکسانیل ۳۰٪	اکوشن پرو	۵۲/۵٪	WG	دوپونت	سفیدک داخلی	سیب زمینی	۱۴ روز	۴۰۰ گرم در هکتار	۸۱/۱۲/۱۹
۲۶۶	فاموکسادون ۲۲/۵٪+سیموکسانیل ۳۰٪	اکولایزر	۵۲/۵٪	WG	خزر سم کود Zhejiang Sega	سفیدک داخلی	پیاز	۳ روز	۴/۰ کیلوگرم در هکتار (مزرعه)	۹۷/۱۲/۱۳
۲۶۷	فاموکسادون ۲۲/۵٪+سیموکسانیل ۳۰٪	زرین پرو	۵۲/۵٪	WG	زرین خوشه جنوب Shanghai Shengnon g	سفیدک داخلی	سیب زمینی	۱۴ روز	۴۰۰ گرم در هکتار	۹۹/۶/۲۴
۲۶۸	فاموکسادون ۲۲/۵٪+سیموکسانیل ۳۰٪	اسپیدول (Spidoll)	۵۲/۵٪	WG	دلتا پارس نهاده Astranova	لکه برگی آلترناریایی	هندوانه	۷ روز	۴۰۰ گرم در هکتار	۱۴۰۳/۹/۱۹
۲۶۹	فلوتریافول	ایمپک	۲٪	SC	کمی نوا	زنگ زرد	گندم	۳۷ روز	۱ در هکتار	۷۵/۱/۲۷

۲۷۰	فلوتیانیل	گاتن	۵٪	EC	الیت ساوان	سفیدک پودری	انگور	۱۴ روز	۲/۵ در هزار	۹۹/۴/۹
					OAT AGRO					
۲۷۱	فلوزیلازول ۱۲/۵٪ + کاربندازیم ۲۵٪	الرت	۷٪	SE	دپونت	سپتوریوز	گندم	۵۶ روز	۱/۲۵ در هکتار	۸۳/۱۰/۲۱
۲۷۲	فلودیوکسانیل	سلسست	۲/۵٪	FS	سینجنتا	پوسیدگی طوقه	برنج		۲ سی سی برای یک خد عفونی کیلو بذر	۸۱/۴/۱۰
۲۷۳	فلوتیانیل	گاتن	۵٪	EC	OAT AGRO	سفیدک پودری	انگور	۱۴ روز	۰/۲۵ در هزار	۹۹/۴/۹
۲۷۴	فلوکساپیروکساد	سرکادیس	۳۰٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	هلو	۲۱ روز	۰/۱۵ در هزار	۱۴۰۰/۴/۲۸
۲۷۵	فلوکساپیروکساد	سرکادیس	۳۰٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	انگور	۲۱ روز	۰/۱۵ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱
۲۷۶	فناماکریل	لیانگدی	۲۵٪	SC	کیمیا سبزینه یونا	فوزاریوم	سنبله گندم	-	۳ لیتر در هکتار (در تناوب با قارچ کش های رایج)	۹۷/۱۰/۱۷
					جیانگ سو					
۲۷۷	فوزتیل آلومینیوم	الیت	۸۰٪	WG	شاندونگ داچنگ	گموز	پسته	۳۰ روز	۲/۵ در هزار	۹۲/۱۲/۵
۲۷۸	فوزتیل آلومینیوم	رودر	۸۰٪	WP	دوگال	گموز	مرکبات	۱۴ روز	۲ در هزار	۹۶/۵/۲
۲۷۹	فوزتیل آلومینیوم	فیتوکیور	۸۰٪	WP	گل سم گرگان	انگومک	پسته	۱۴ روز	۲/۵ در هزار	۹۹/۱۰/۲۲
					Limin Chemical					
۲۸۰	فوزتیل آلومینیوم ۶۶/۶۷٪ + فلوپیکولید ۴/۴۵٪	پروفایلر	۷۱/۱٪	WG	بایر آگ	سفیدک داخلی	انگور	۷ روز	۲-۲/۵ در هزار بسته به شدت بیماری در سه نوبت	۹۵/۸/۲۴
۲۸۱	عصاره اسپند (هارمین)	نانوپگان	۱۳٪	نانوامولسیون	زیست کنترل نانو مقیاس	پوسیدگی فوزاریومی ریشه و ساقه	گوجه فرنگی		۱۵ در هزار	۱۴۰۳/۷/۱۶
					گیاه پرئیان اطلس					

۲۸۲	عصاره سیر	آلیسین	۵٪	ME	Chengdu Newsun Crop Science	سفیدک پودری	خیار گلخانه ای	-	یک در هزار	۱۴۰۳/۱۲/۱۱
۲۸۳	عصاره سیر ، روغن پنبه دانه، روغن ذرت	میلدی کیور	۸۳٪	SL	بازرگان کالا	سفیدک پودری	خیار	-	مزرعه: ۱۰ در هزار	۹۶/۸/۲۹
					Jh biotech				گلخانه: ۷/۵ در هزار	
۲۸۴	کاپتان	ارتوساید	۷۵٪	WP	آریستا	گیاهچه اشجار	اشجار جنگلی و گیاهان مثمر	۱۰ روز	۷/۵-۱۰ گرم در متر مربع تا عمق ۱۰ سانتیمتری خاک	۴۷/۱۰/۱
۲۸۵	کاپتان	ارتوساید	۷۵٪	WP	آریستا	پیچیدگی برگ	هلو	۱۰ روز	۳-۳/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۸۶	کاربندازیم	باویستین	۵۰٪	WP	بایرساینس کروپ	سیاهک آشکار و پنهان	گندم		۲/۵ در هزار	۵۳/۲/۲۳
۲۸۷	کاربندازیم	باویستین	۵۰٪	WP	بایرساینس کروپ	سیاهک آشکار و پنهان	جو		۲/۵ در هزار	۵۳/۲/۲۳
۲۸۸	کاربندازیم	باویستین	۶۰٪	WP	بایرساینس کروپ	سیاهک آشکار و پنهان	گندم		۲ در هزار	۵۳/۲/۲۳
۲۸۹	کاربندازیم	باویستین	۶۰٪	WP	بایرساینس کروپ	سیاهک آشکار و پنهان	جو		۳ در هزار	۵۳/۲/۲۳
۲۹۰	کاربوکسین	ویتاواکس	۷۵٪	WP	یونی رویال	سیاهک اشکار	گندم - جو		۲ در هزار	۵۱/۱۱/۱۶
۲۹۱	کاربوکسین	ویتاواکس	۷۵٪	WP	یونی رویال	مرگ گیاهچه	حبوبات		۲ در هزار	۵۱/۱۱/۱۶
۲۹۲	کاربوکسین	ویتاواکس	۷۵٪	WP	یونی رویال	ضد عفونی	حبوبات		۲ در هزار	۵۱/۱۱/۱۶
۲۹۳	کاربوکسین ۳۷/۵٪ + تیرام ۳۷/۵٪	ویتاواکس تیرام	۴۰٪	FL	Krampton	سیاهک اشکار	گندم		۲ در هزار به روش ضد عفونی بذر	۵۲/۴/۶
۲۹۴	کاربوکسین ۳۷/۵٪ + تیرام ۳۷/۵٪	ویتاواکس تیرام	۴۰٪	FL	Krampton	سیاهک اشکار	جو		۲ در هزار به روش ضد عفونی بذر	۵۲/۴/۶
۲۹۵	کاربوکسین ۳۷/۵٪ + تیرام ۳۷/۵٪	ویتاواکس تیرام	۴۰٪	FL	Krampton	سیاهک پنهان	گندم		۲ در هزار به روش ضد عفونی بذر	۵۲/۴/۶

۲۹۶	کاربوکسین ۳۷/۵٪ + تیرام ۳۷/۵٪	ویتاواکس تیرام	۷۵٪	WP	Krampton	پوسیدگی برفی	گندم		۲ در هزار به روش ضد عفونی بذر	۵۲/۴/۶
۲۹۷	کاربوکسین ۳۷/۵٪ + تیرام ۳۷/۵٪	ویتاواکس تیرام	۷۵٪	WP	Krampton	لکه قهوه ای نواری	برنج		۲ در هزار به روش ضد عفونی بذر	۵۲/۴/۶
۲۹۸	کاربوکسین ۳۷/۵٪ + تیرام ۳۷/۵٪	ویتاواکس تیرام	۷۵٪	WP	Krampton	پوسیدگی طوقه و ریشه	برنج		۲ در هزار به روش ضد عفونی بذر	۵۲/۴/۶
۲۹۹	کاربوکسین ۳۷/۵٪ + تیرام ۳۷/۵٪	ویتاواکس تیرام	۷۵٪	WP	Krampton	مرگ گیاهچه	پنبه		۴-۶ در هزار به روش ضد عفونی بذر	۵۲/۴/۶
۳۰۰	کاربوکسین ۳۷/۵٪ + تیرام ۳۷/۵٪	ویتاواکس تیرام	۷۵٪	WP	Krampton	مرگ گیاهچه	چغندر		۲-۲/۵ در هزار به روش ضد عفونی بذر	۵۲/۴/۶
۳۰۱	کاربوکسین ۳۷/۵٪ + تیرام ۳۷/۵٪	ویتاواکس تیرام	۷۵٪	WP	Krampton	سیاهک پنهان و طویل	ذرت		۲ در هزار به روش ضد عفونی بذر	۵۲/۴/۶
۳۰۲	کاربوکسین ۳۷/۵٪ + تیرام ۳۷/۵٪	ویتاواکس تیرام	۷۵٪	WP	Krampton	سیاهک خوشه ای	ذرت		۲/۵ در هزار به روش ضد عفونی بذر	۵۲/۴/۶
۳۰۳	کاربوکسین ۳۷/۵٪ + تیرام ۳۷/۵٪	ویتاواکس تیرام	۷۵٪	WP	Krampton	لکه قهوه ای نواری	جو		۲/۵ در هزار به روش ضد عفونی بذر	۷۵/۴/۱۸
۳۰۴	کارپروپامید	وین	۳۰٪	SC	بایر کروپ ساینس	بلاست	برنج		۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	۸۱/۱۱/۷
۳۰۵	کروزکسیم متیل	استروبی	۵۰٪	WG	ب آ اس اف	سفیدک پودری	کدوئیان	۴ روز	۰/۲ در هزار	۸۷/۵/۲
۳۰۶	کروزکسیم متیل	استروبی	۵۰٪	WG	ب آ اس اف	سفیدک پودری	سیب		۰/۱۶-۰/۲ در هزار	۸۲/۴/۹
۳۰۷	کروزکسیم متیل	استروبی	۵۰٪	WG	ب آ اس اف	لکه سیاه	سیب		۰/۲ در هزار	۸۳/۸/۱۱
۳۰۸	کروزکسیم متیل	استروبی	۱۵۰٪	WG	ب آ اس اف	سفیدک پودری	انگور	۱۴ روز	۰/۲ در هزار	۱۴۰۴/۵/۱۳
۳۰۹	کوپراکسی کلراید	کوپراویت	۳۵٪	WP	بایر کروپ ساینس	مومیایی پیچیدگی برگ	هلو - درختان میوه سردسیری		۳ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۱۰	کوپراکسی کلراید	کوپراویت	۳۵٪	WP	بایر کروپ ساینس	پوسیدگی گل اذین	نخیلات		۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۱۱	کوپراکسی کلراید	کوپراویت	۳۵٪	WP	بایر کروپ ساینس	سفیدک دروغی	گوجه فرنگی		۳ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۱۲	کوپراکسی کلراید	کوپراویت	۳۵٪	WP	بایر کروپ ساینس	سفیدک دروغی	سیب زمینی		۳ در هزار	۴۷/۱۰/۱

۳۱۳	کوپراکسی کلراید	کوپراویت	۳۵٪	WP	بایر کروب ساینس	سفیدک داخلی	سبزی و جالیز		۱-۲ لیتر در هکتار٪	۴۷/۱۰/۱
۳۱۴	کوپراکسی کلراید	کوپراویت	۳۵٪	WP	بایر کروب ساینس	گموز	مرکبات		دو غاب ۱٪	۴۷/۱۰/۱
۳۱۵	کوپراکسی کلرید	کوپر پلاس	۵۰٪	WP	آرمان سبز آدینه شیام کمیکالز	سفیدک داخلی	گوچه فرنگی	۳ روز	۲ در هزار	۱۴۰۰/۴/۱۴
۳۱۶	کینوسول	بلتانول	۳۷/۵٪	SL	سبا کوشا کشت پروبلت فیتو اسپانیا	بوته میری <i>Phytophthora melonis</i>	خیار (گلخانه و فضای باز)	ندارد	۰/۵ در هزار (نوبت اول بلافاصله پس از کاشت و نوبت دوم بین مرحله ۲-۳ برگی همراه با آب آبیاری)	۹۸/۴/۱۰
۳۱۷	مندی پروپامید ۲۵٪+ دیفنو کونازول ۲۵٪	کاریال استار	۵۰٪	SC	سینجنتا	سفیدک داخلی	خیار (گلخانه)	۱ روز	۰/۷ در هزار (استفاده بیش از دو نوبت متوالی و بیش از ۴ نوبت در یک دوره تولید ممنوع است.	۹۷/۱۰/۱۷
۳۱۸	مندی پروپامید ۲۵٪+ دیفنو کونازول ۲۵٪	کاریال استار	۵۰٪	SC	سینجنتا	لکه موجی- سفیدک داخلی	گوچه فرنگی	۳ روز	۷۰۰ میلی لیتر در هکتار در مناطق مرطوب کناره های دریای خزر و سواحل خلیج	۱۴۰۲/۳/۲۹
۳۱۹	مانکوزب	دیتان ام ۴۵	۸۰٪	WP	داو آگرو ساینس	سیاهک پنهان	گندم	۱۰ روز	۲ در هزار به طریق ضد عفونی بذر	۴۸/۱۲/۳
۳۲۰	مانکوزب	دیتان ام ۴۵	۸۰٪	WP	داو آگرو ساینس	لکه اجری	بادام	۱۰ روز	۲ در هزار	۴۸/۱۲/۳
۳۲۱	مانکوزب	دیتان ام ۴۵	۸۰٪	WP	داو آگرو ساینس	سفیدک داخلی	یونجه	۱۰ روز	۲ کیلوگرم در هکتار	۴۸/۱۲/۳
۳۲۲	مانکوزب	دیتان ام ۴۵	۸۰٪	WP	داو آگرو ساینس	برق زدگی	نخود	۱۰ روز	۲ کیلوگرم در هکتار	۴۸/۱۲/۳

۳۲۳	مانکوزب	دیتان ام ۴۵	۸۰٪	WP	داو آگرو ساینس	سفیدک داخلی	توتون	۱۰ روز	۱-۲ در هزار	۴۸/۱۲/۳
۳۲۴	مانکوزب	دیتان ام ۴۵	۸۰٪	WP	داو آگرو ساینس	زنگ	میخک	۱۰ روز	۱/۵-۲ در هزار همراه با مویان ۵/۰ در هزار	۴۸/۱۲/۳
۳۲۵	مایکلوبوتانیل	آتیس	۴۰٪	WP	سبزمحصول داتیس	لکه سیاه	سیب درختی	۵ روز	۰/۳ در هزار (به صورت تناوبی با قارچ-کش-های دیگر)	۹۷/۹/۲۶
					ناگارجونا اگری کم					
۳۲۶	متا بی سولفیت سدیم	سولفور پد	۷ گرم متا بی سولفیت	پد کاغذی	اروم زرین خوشه	بیماریهای قارچی	انگور	-	یک بسته ۷ گرمی برای نگهداری ۵ کیلوگرم انگور	۸۶/۸/۲۸
۳۲۷	متالاکسیل	ریدومکس	۵٪	GR	اکسیر کشاورزی یزد	بوته میری <i>Pythium aphanidematu m</i>	خیار گلخانه ای	۷ روز	۲ گرم در متر مربع (گلخانه) در سطح محدود به صورت گرانول پاشی (۱۴۰۰/۱۱/۲۵)	۹۹/۹/۱۷
					منبع تکنیکال Zhejiang Heben					
۳۲۸	متالاکسیل	ردوکسیل	۵٪	GR	گیاه	بوته میری <i>Pythium aphanidematu m</i>	خیار گلخانه ای	۷ روز	۲ گرم در متر مربع (گلخانه) در سطح محدود به صورت گرانول پاشی (۱۴۰۰/۱۱/۲۵)	۹۹/۹/۱۷
					منبع تکنیکال Zhejiang Heben					
۳۲۹	متالاکسیل	ریدومیل	۵٪	GR	سینجتتا	بوته میری	خیار	۷ روز	۲۵-۲۰ کیلو گرم در هکتار	۷۰/۱۱/۲۱
۳۳۰	متالاکسیل ۸٪+ مانکوزب ۶۴٪	داونی جی	۷۲٪	WP	گیاه	بوته میری در مزرعه و گلخانه	خیار	۷ روز	۲ در هزار در مزرعه به صورت محلول ریزی پای بوته و در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق	۹۶/۴/۱۹

۳۳۱	متالاکسیل ۸٪+ مانکوزب ۶۴٪	رزالاکسیل	۷۲٪	WP	بهاور شیمی	بوته میری در مزرعه و گلخانه	خیار	۷ روز	۲ در هزار در مزرعه به صورت محلول ریزی پای بوته و در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار ۲۰۰ گرم در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک	۹۳/۲/۱۵
۳۳۲	متالاکسیل ۸٪+ مانکوزب ۶۴٪	رزالاکسیل	۷۲٪	WP	بهاور شیمی	سفیدک داخلی	سیب زمینی	۷ روز	۳ کیلوگرم در هکتار	۹۴/۷/۶
۳۳۳	متالاکسیل ۸٪+ مانکوزب ۶۴٪	منوکولاکسیل	۷۲٪	WP	کیمیا گوهر خاک Leeds	سفیدک داخلی	سیب زمینی	-	۲/۵ کیلوگرم در هکتار	۹۹/۳/۱۲
۳۳۴	متالاکسیل ۸٪+ مانکوزب ۶۴٪	منوکولاکسیل	۷۲٪	WP	ایرمان UPL	بوته میری	خیار گلخانه	-	۲ در هزار	۹۹/۹/۱۷
۳۳۵	متالاکسیل ام (مفنو کسام) ۱۰ گرم/لیتر+فلودیوکسانیل ۲۵ گرم/لیتر	ماکسیم ایکس ال	۳/۵٪	FS	سینجنتا	فوزاریوم	ذرت		۱ در هزار	۱۴۰۰/۶/۱
۳۳۶	متالاکسیل ام (مفنو کسام) ۱۰ گرم/لیتر+فلودیوکسانیل ۲۵ گرم/لیتر	ماکسیم ایکس ال	۳/۵٪	FS	سینجنتا	بوته میری پیتیومی	گوجه فرنگی		۱ میلی لیتر در هر کیلوگرم بذر	۱۴۰۳/۱۰/۲۴
۳۳۷	متالاکسیل ام (مفنو کسام) ۱۰ گرم/لیتر+فلودیوکسانیل ۲۵ گرم/لیتر	ماکسیم ایکس ال	۳/۵٪	FS		مرگ گیاهچه	چغندر قند		۳ در هزار (ضد عفونی بنور)	۱۴۰۴/۳/۵
۳۳۸	متالاکسیل ام ۱۰ گرم/لیتر+فلودیوکسانیل ۲۵ گرم/لیتر	مالوین ایکس ال اف اس ۰۳۵	۳/۵٪	SC	گیاه پرنیان اطلس Safa Tarim	پوسیدگی فوزاریومی ریشه	پیاز	۱۴ روز	۳/۵ لیتر در هکتار در مناطق با آلودگی زیاد ۲/۵ لیتر در هکتار در مناطق با آلودگی کم	۱۴۰۱/۹/۱

۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲/۵ میلی لیتر در کیلوگرم بذر برای ضد عفونی	۱۴ روز	گوجه فرنگی	بوته میری پیتیومی و پوسیدگی فوزاریومی ریشه	رویال ساکار تجارت	Fluid Concentrate for Seed Treatment		هاکی ایکس ال(Hockey XL) (FS ۰۳۵)	متالاکسیل ام (مفنوکسام) ۱۰ گرم/لیتر+فلودیوکسانیل ۲۵ گرم /لیتر	۳۳۹
	۲/۵ در هزار (محلول پاشی) در سه مرحله: یک بار به سینی نشا در زمان انتقال نشا(۳ لیتر در هر متر مربع سینی کشت) و دو بار پس از انتقال به مزرعه به فاصله یک هفته همراه آب آبیاری (۵۰ میلی لیتر برای هر بوته)				دوگال					
۹۸/۴/۱۰	۱/۵ لیتر در هزار	۲ روز	خیار(گلخانه و فضای باز)	بوته میری	سینجنتا	SE	۴۴/۶٪	یونیفورم	متالاکسیل ام (مفنوکسام) ۱۲/۴٪+ آزوکسی استروبین ۳۲/۲٪	۳۴۰
۹۹/۴/۹	۲/۵ در هزار	۲۱ روز	گوجه فرنگی	سفیدک داخلی	پیراکشت شیمی	SC	۲۲٪	آر متیل آر	متالاکسیل ۳/۵٪ + هیدروکسید مس ۱۸/۵٪	۳۴۱
					Industrias Quimicas Valles					
۱۴۰۲/۵/۳۰	یک در هزار	۲۱ روز	انگور	سفیدک پودری	ب آ اس اف	SC	۷/۵٪	رویونا	مفن تری فلوکونازول	۳۴۲
۹۵/۶/۲۹	۳-۴ در هزار	ندارد	خیار- گلخانه	سفیدک داخلی	Ji Biotech	SL	۵۳٪	فسفاتیت	نمک های مونو و دی پتاسیم اسید فسفونیک	۳۴۳
۱۴۰۰/۹/۲۹	۲/۵ در هزار	ندارد	پسته	پوسیدگی فایتوفترایی ریشه و طوقه	بصیر شیمی	SL	۶۰٪	اگریفوس	نمک های مونو و دی پتاسیم اسید فسفونیک	۳۴۴
					Agrichem					
۸۳/۱۰/۲۱	۶ لیتر درهکتار	ندارد	سیب زمینی	سفیدک داخلی	اگری کم	SL	۴۰٪	اگریفوس	نمک های مونو و دی پتاسیم اسید فسفونیک	۳۴۵

۳۴۶	های مکسازول	تاچی گارن	۳۰٪	SL	Mitsui	پژمردگی فوزاریمی	گوجه فرنگی	۱۰ روز	قبل از انتقال نشاء یک در هزار، یک هفته بعد از انتقال نشاء دو در هزار و دو هفته پس از سمپاشی دوم به مقدار ۲ در هزار	۹۵/۱۰/۲۷
۳۴۷	هگزاکونازول	انویل	۵٪	SC	سینجنتا	سفیدک پودری	انگور	۱۴ روز	۰/۲۵ در هزار	۷۹/۱۲/۱۵
۳۴۸	هیدروکسید مس ۱۴٪+اکسی کلرور مس ۱۴٪	BADGE	۲۸٪	WG	بازارگان کالا	پیچیدگی برگ	هلو	۷ روز	۱/۲ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱۵
					ISAGRO					
۳۴۹	هیدروکسید مس ۱۴٪+اکسی کلرور مس ۱۴٪	BADGE	۲۸٪	WG	بازارگان کالا	سفیدک کرکی	گوجه فرنگی	۳ روز	۲/۵ کیلوگرم در هکتار	۱۴۰۱/۵/۱۰
					ISAGRO					
۳۵۰	هیدروکسید مس ۲ Cu(OH)	توبالین Tobalin	۵٪	SC	شرکت کیمیا سبز آور	سفیدک داخلی <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	خیار گلخانه		۵ در هزار	۱۴۰۴/۳/۵

[illegible]

دلتا پارس نهاده	SC	۴۵٪	ریوالدو	پروپامو کارب هیدروکلراید ۴۰ ۰ گرم/لیتر+ سیموکسانیل
آگريا				

--	--	--	--	--

۱۴۰۳/۹/۵	۲ لیتر در هکتار و حداکثر دو بار محلول پاشی	۷ روز	گوجه فرنگی	سفیدک داخلی
----------	--	-------	------------	-------------