

آفت کش های مجاز برای محصول سیب زمینی

نوع	ترکیب	فرمولاسیون	دوز
	<i>Steinernema carpocapsa</i>	86%	۶ گرم در لیتر
	اسپیرومسیفن	SC 24%	۰/۴ لیتر
	اسپینوساد	SC 24%	۷۵ میلی لیتر
	اسپینوساد	SC 24%	۲۰۰ میلی لیتر
	اسپیروترامات	SC 10%	۰/۷۵ لیتر
	اسپیروترامات	SC 10%	۰/۶ لیتر
	اسپیرودیكلوفن	SC 24%	۰/۵ در هزار
	اسپیرومسیفن	SC 24%	۰/۵ لیتر
	امامکتین بنزوات + استامی پرید	EC 11.2%	۱/۵ در هزار
	ایمیداکلوپرید	WS 70%	۲۸/۵ گرم برای یک صد کیلوگرم غده بذری
	آبامکتین	EC 1.8%	۰/۶ لیتر
	آزادیرااختین	EC 0.15%	۲/۵ لیتر در هکتار در مزرعه
	آزادیرااختین	EC 3%	۴ در هزار
	آسفیت	SG 90%	۰/۷ در هزار
	آلفاسایپر مترین	SC 10%	۶ گرم در لیتر

حشره کش ، کنه کش

بروموپروپیلات	EC 25%	۰/۷۵ در هزار
پروپارژیت	EC 57%	۱ در هزار
پیرترین	WP 0.1%	۳ کیلوگرم در تن
پیریمیکارب	WP 50%	۰/۷ - ۰/۵ کیلوگرم
پیریمیکارب	DF50%	۰/۷ - ۰/۵ کیلوگرم
پی متروزین	WG 50%	۰/۵ کیلوگرم
پی متروزین	WP 25%	۱ کیلوگرم
تترادیفون	EC 7.52%	۲ در هزار
تیاکلورپید + دلتامترین	OD 11%	۱ - ۰/۷ لیتر
تیامتوکسام	FS35%	۴۰ میلی لیتر برای یک صد کیلوگرم غده بذری
تیامتوکسام	SC 24%	۰/۲ - ۰/۲۵ لیتر
تیامتوکسام + آبامکتین	SC 18.5%	۰/۷۵ در هزار
تیامتوکسام + آبامکتین	SC 18.5%	۱۰۰۰ میلی لیتر
تیوسیکللام هیدروژن اکسالات	SP 50%	۰/۷۵ کیلوگرم
دلتامترین	EC 2.5%	۳۰۰ میلی لیتر
دیکلرووس	EC 50%	۱/۵ - ۲ در هزار
دینوتفوران	SG 20%	۰/۷۵ کیلوگرم

روغن پنبه دانه و میخک (پست اوت)	SL 70%	۳ در هزار
سیتروننول + فارنزول + نرولیدول + گرانیول	EC 1.36%	۲ در هزار
فلوپیرادیفوران	SL 20%	۰/۷۵ در هزار
فلومتوکوبین	SC 10%	۷۵۰ میلی لیتر
فنیتروتیون	EC 50%	۱ لیتر یا ۲- ۱/۵ در هزار
فوزالن	EC 35%	۲ - ۳ لیتر
فیپرونیل	G 0.2%	۶۰ کیلوگرم
کلوتیانیدین + لامبدا سای هالوترین	ZC 28%	۱ لیتر
ماترین	SL 0.3%	۱/۵ در هزار
مالاتیون	EC 57%	۲ - ۱ در هزار
هپتتفوس	EC 50%	۱ در هزار
هگزی تیاژوکس	EC 10%	۰/۵ در هزار
<i>Talaomyces flavus</i> TF PO V52		۶۰ کیلوگرم برای ۴ تن سیب زمینی (بذر مال کردن)
<i>Trichoderma harizianum</i> HA- 22 b	P5%	۳ در هزار
اکسی کلرور مس + سیموکسانیل	WP 43.95%	۳ کیلوگرم
اکسید مس	WG 75%	۱ کیلوگرم
اکسی کلرور مس	WP 35%	۲ - ۱ کیلوگرم و ۳ در هزار

اکسی
آر
پروپا
پروپ
پروپامو

قارچ کش



تتراکونازول + آزوکسی استروبین	SC 18%	۶۰۰ میلی لیتر
تیابندازول	WP 60%	۲ در هزار
دی متومورف + پیراکلواستروبین	EC 11/2%	۲ لیتر
دیمتومورف + مانکوزب	WG 69%	۲ کیلوگرم
سولفور	WP80-90%	۳ در هزار
سیموکسانیل + فاموکسادون	WDG 52.5%	۲۰۰-۴۰۰ گرم
سیموکسانیل + مخلوط بردو	WP 25.5%	۲/۵ - ۲ کیلوگرم
سیازوفامید	SC 40%	۰/۱۵ لیتر
فسفونیک اسید	SL 40%	۶ لیتر
فلودیوکسونیل	FS 10%	۲۵۰ میلی لیتر به ازای هزار کیلوگرم غده بذری
فلوکساپیروکساد + دیفنوکونازول	SC 12.5%	۷۵۰ میلی لیتر
فوزتیل آلومینیوم + بردومیکسچر	WP 33%	۳ کیلوگرم
کینوسول	SL 37.5%	۰/۵ در هزار
ماندی پروپامید + دیفنوکونازول	SC 50%	۷۰۰ میلی لیتر
متالاکیل	G 5%	۲۵ - ۲۰ کیلوگرم خاک کاربرد (۲ در هزار)
متالاکیل + هیدروکسید مس	SC 22%	۲/۵ در هزار
مفنوکسام + آزوکسی استروبین	EC 44.6%	۱/۵ در هزار

نمکهای مونو و دی پتاسیم اسید فسفونیک	SL 53%	۴ - ۳ در هزار
هیدروکسید مس + اکسی کلراید مس	SC 28%	۲/۵ کیلوگرم
پندی متالین	CS 45/5%	۳ لیتر
سولفوسولفورون	WG 75%	۳۵ گرم
متری بوزین	WP 70%	۱ - ۰/۷۵ کیلوگرم
متری بوزین	DF 75%	۱ - ۰/۷۵ کیلوگرم
متری بوزین	SC 48%	۱ لیتر
ایمیسایفوس	G 1.5%	۱۵۰ کیلوگرم
فلوپیرام	SC 40%	۶۲۵ میلی لیتر در دو مرحله
فوستیازیت	G 10%	۲۵ کیلوگرم
فوستیازیت	EC 90%	۲/۵ لیتر یک روز قبل از کاشت یا محلول در اولین آبیاری مزرعه،
متام سدیم	SL 32.7%	۵۰ گرم در هر مترمربع خاک یا ۳۲ گرم در هر مترمکعب بذر
فسفات آهن	B 1%	۵ گرم در مترمربع
متالدهاید	B 6%	۲۵-۲۰ کیلوگرم طعمه ۶٪
متالدهید	B 5%	۷ کیلوگرم طعمه

دوره کارنس
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
۴ روز
۴ روز
؟
؟

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

9

9

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

۱۵ روز

?

؟
؟
؟
؟
؟
۷ روز
۳ روز
۱۵ روز
۳ روز
؟
؟
۷ روز
؟
؟
؟

?

?

?

۷ روز

?

۱۴ روز

?

?

?

?

۷ روز

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

